



REPUBLIKA E KOSOVËS-REPUBLIKA KOSOVA-REPUBLIC OF KOSOVA	
QEVERIA E KOSOVËS-VLADA KOSOVA-GOVERNMENT OF KOSOVA	
MINISTRIA E SHËNDETËSISË-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA-MINISTRY OF HEALTH	
Njesia Org. Org.Jednica Org Unit	01
Nr. Prot. Org. Prot.	05-1700
Nr. i faqeve Br. stranica No. pages	-42-
Data: Datum:	11.03.2024
Prishtinë / a	

Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-Government

Ministria e Shëndetësisë-Ministarstvo Zdravstva-Ministry of Health
Zyra e Ministrit/Ured Ministra/Office of the Minister

Nr.33/III/2024
Datë:07.03.2024

Ministri i Shëndetësisë, në mbështetje të Nenit 145, pika 2, të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, në përputhje me nenet 10 dhe 11 të Ligjit Nr.06/L-113 për Organizimin dhe Funksonimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura (Gazeta zyrtare Nr.7.01 Mars 2019), nenit 11 paragrafi 1.5 i Ligjit nr.08/L-117 për Qeverinë e Republikës së Kosovës, Rregulloren (QRK) Nr.14/2023, për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive, Shtojca 1 paragrafi 6 nën paragrafi 6.1, nxjerrë:

V E N D I M

Për ndryshim -plotësim të Listës esenciale të nivelit primar, sekondar dhe terciar të barnave dhe materialit shpenzues e cila mbulohet nga Buxheti i Republikës së Kosovës

- I. Plotësohet dhe ndryshohet Lista esenciale e nivelit primar, sekondar dhe terciar e barnave dhe materialit shpenzues e cila mbulohet nga Buxheti i Republikës së Kosovës të aprovuar me Vendimin Nr. prot.05-3113, datë 22.05.2023.
- II. Shtojcë e këtij vendimi është versioni katër (4) i Listës esenciale e ndryshuar dhe plotësuar e nivelit primar, sekondar dhe terciar e barnave dhe materialit shpenzues e cila mbulohet nga Buxheti i Republikës së Kosovës.
- III. Obligohet Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë t'i njoftojë të gjitha institucionet për zbatimin e listës së barnave esenciale dhe materialit shpenzues.
- IV. Vendimi hyn në fuqi ditën e nënshkrimit nga Ministri i Shëndetësisë.

Vendim i dërgohet:

- Zëvendësministrave;
- Sekretarit të Përgjithshëm;

Dr. Arben Vitha
Ministër i Shëndetësisë

- *Inspektoratit Shëndetësor*
- *FSHSH-së;*
- *SHSKUK;*
- *AKPM;*
- *IKSHPK;*
- *QKTGJ;*
- *Divizionit të Farmacisë;*
- *Divizionit të Prokurimit;*
- *Divizionit të Kujdesit parësor;*
- *DFSHP;*
- *Departamenti ligjor;*
- *Arkivit të MSh;*

Lista Esenciale e nivelit primar, sekondar dhe terciar të kujdesit shëndetësor - Barnat (verzioni i 4 i përditësuar i LBE 2023)				
			Kategorizimi	ATC
1. ANESTETIKËT, BARNAT PREOPERATIVE DHE GAZET MEDICINALE				
1.1 Anestezia e përgjithshme dhe oksigjeni				
1.1.1 Barnat inhalatore				
sevoflurane*	Tretësirë: 250 mL *Furnizimet të kenë edhe pajisje (adapter) për kyçe në voserizer		H(S/T)	N01AB08
nitrous oxide	Inhalim		H(S/T)	N01AX13
oxygen	Inhalim (gaz medicinal)		ISHSP	V03AN01
1.1.2 Barnat e injektueshme				
ketamine	Injeksion: 50 mg (si hidroklorur)/ mL, 10- mL flakon		H(S/T)	N01AX03
propofol	Injeksion: 10 mg/mL		H(S/T)	N01AX10
thiopental sodium	Pluhur për tretësirë për injeksion: 500 mg Indikacionet: anestezioni i përgjithshëm, indukimi i komës barbiturike, ndërprerja e konvulzioneve epileptike		H(S/T)	N01AF03
etomidate	Injeksion: 2 mg/mL, 10 mL		H(S/T)	N01AX07
1.2 Anestezikët lokal				
bupivacaine	Injeksion: 0.25%; 0.5% (hidroklorur) në flakon ose ampullë		H(S/T)	N01BB01
lidocaine	Injeksion: 1%; 2% (hidroklorur) në flakon, IM dhe IV		ISHSP	N01BB02
	Forma topikale: 2%		ISHSP	D04AB01
lidocaine + epinephrine (adrenaline)	Injeksion: 2% (hidroklorur ose sulfat) + epinephrinë 1:200 000 në flakon		ISHSP	N01BB52
ropivacaine	Injeksion: 2 mg/mL, 10 mL epidural		H(S/T)	N01BB09
ephedrine*	Injeksion: 30 mg (hidroklorur)/ mL në 1- mL		ISHSP	C01CA26
	*Për përdorim gjatë anestezisë spinale, për të parandaluar hipotensionin			
1.3 Barnat preoperative dhe sedative për procedura të shkurta				
atropine	Injeksion: 1 mg (sulfat) në 1- mL		ISHSP	A03BA01
midazolam	Injeksion: 1 mg/mL, 5 mL		H(S/T)	N05CD08
	Tretësirë orale: 2 mg/mL			
morfinë	Injeksion: 10 mg (sulfat spo hidroklorur) në 1- mL		H(S/T)	N02AA01
1.4 Gazrat Medicinale				
oxygen	Inhalim - Për përdorim në menaxhimin e hipoksisë *Jo më shumë se 30% oksigjen te neonatët më pak ose baraz me 32 javë gestative		ISHSP	V03AN01
2. BARNAT PËR DHEMBJE DHE KUJDES PALIATIV				

2.1 Barnat antiinflamatore josteroideale dhe jo-opioide				
acetylsalicylic acid	Tableta: 100 mg dhe 500 mg		BRP	B01AC06
ibuprofen	Tretësirë orale: 100 mg/5 mL		BRP	M01AE01
	Tableta: 200 mg; 400 mg			
paracetamol	Tretësirë orale: 120 mg/5 mL		BRP	N02BE01
	Supozitore: 80 mg, 125 mg, 150 mg			
	Tableta: 500 mg			
	Tretësirë për infuzion: 500 mg, 1g		ISHSP	
diclofenac	Injeksion: 25 mg/mL, 3 mL		ISHSP	M01AB05
metamizol	Injeksion: 1 g/2 mL		ISHSP	N02BB02
2.2 Analgjezikët opioid				
fentanyl*	Fllaster transdermal: 12 mcg/hr; 25 mcg/hr; 50 mcg/hr; 75 mcg/hr; 100 mcg/hr *Për menaxhimin e dhembjeve kanceroze		H(S/T), PP	N02AB03
	Injeksion: 50 mcg/mL, 2 mL		H(S/T)	N01AH01
	Tableta: 300 mcg sublingual		H(S/T)	N02AB03
morfinë	Granula (lirim i ngadalësuar, të tretet me ujë): 20 mg –200 mg (sulfat morfine)		H(S/T), PP	N02AA01
	Injeksion: 10 mg (hidroklorur morfine ose sulfat morfine) në ampullë 1- mL		H(S/T)	
	Tretësirë orale: 10 mg (hidroklorur morfine ose sulfat morfine)/5 mL		H(S/T), PP	
	Tableta (lirim i ngadalësuar): 10 mg–200 mg (hidroklorur morfine ose sulfat morfine)		H(S/T), PP	
	Tableta (lirim i menjëhershëm): 10 mg (sulfat morfinë)		H(S/T), PP	
oxycodone	Formë e fortë orale: 20 mg		H(S/T), PP	N02AA05
tramadol	Injeksion: 50 mg/mg, 2 mL		ISHSP	N02AX02
methadone	Tretësirë orale: 10 mg/5 mL		H(S/T), PP	N07BC02
	Indikacionet: për menaxhimin e dhembjes kanceroze, për trajtimin e varshmërisë prej opioideve			
2.3 Barnat për simptoma tjera të zakonshme dhe kujdes paliativ				
dexamethasone	Injeksion: 4 mg/ mL në ampulla 1 mL (si kripë dinatrium fosfat)		ISHSP	H02AB02
	Tretësirë orale: 2 mg/5 mL		ISHSP	A01AC02

	Tableta: 4 mg		ISHSP	H02AB02
diazepam	Injeksion: 5 mg/ mL		ISHSP	N05BA01
	Tretësirë rektale: 5 mg		ISHSP	
	Tableta: 5 mg; 10 mg		ISHSP	
hyoscine butylbromide	Injeksion: 20 mg/ mL		ISHSP	A03BB01
lactulose	Tretësirë orale		BPR	A06AD11
loperamide	Format e forta orale: 2 mg		ISHSP	A07DA03
3. ANTIALERGJIKËT DHE BARNAT TJERA TË CILËT PËRDOREN NË ANAFILAKSË				
epinephrine (adrenaline)	Injeksion: 1 mg (si hidroklorur ose hidrogjen tartrate) në ampullë 1 mL		ISHSP	C01CA24
hydrocortisone	Injeksion: 100 mg (si suksinat natriumi) në flakon		ISHSP	H02AB09
loratadine	Tretësirë orale: 1 mg/ mL		ISHSP	R06AX13
	Tableta: 10 mg		ISHSP	
prednisolone	Tableta: 5 mg, 20 mg		ISHSP	H02AB06
chloropyramine	Injeksion: 10 mg/mL, 2 mL		ISHSP	R06AC03
noradrenaline	Injeksion: 2 mg/mL, 4 mL IV dhe 1 mg/mL, 10 mL		ISHSP	C01CA03
4. ANTIDOTËT DHE SUBSTANCAT TJERA TË CILAT PËRDOREN TE HELMIMET				
karboni aktiv	Pluhur: 250 g Indikacioni: te helmimet me medikamente dhe toksina të ndyshme të cilat janë futur përmes traktit tretës		BPR	A07BA01
acetylcysteine	Injeksion: 200 mg/ mL në 10- mL ampullë		H(S/T)	R05CB01
	Tretësirë orale: 20%		ISHSP	
naloxone	Injeksion: 400 mcg (hidroklorur) në ampullë 1- mL		H(S/T)	A06AH04
pralidoksim	Injeksion: 1g, 10 mL IV		H(S/T)	V03AB04
flumazenil	Injeksion: 0.1 mg/mL, 5 mL		ISHSP	V03AB25
5. 5. ANTIKOVLZANTET/ANTIEPILEPTIKËT				
carbamazepine	Tretësirë orale: 100 mg/5 mL		H(S/T), PP	N03AF01
	Format e forta orale: 200 mg, 400 mg		H(S/T), PP	
lorazepam	Formulim parenteral: 2 mg/ mL në ampullë 1 mL, 4 mg/ mL në ampullë 1 mL		H(S/T), PP	N05BA06
magnesium sulfate	Injeksion: 0.5g/ mL në 10- mL ampullë (ekuivalent to 5 g in 10 mL; 50% peshë/vëllim)		H(S/T)	A06AD04
phenobarbital	Injeksion: 200 mg/ mL (natrium)		H(S/T), PP	N03AA02
	Tretësirë orale: 15 mg/5 mL		H(S/T), PP	
	Tableta: 15 mg dhe 100 mg		H(S/T), PP	
phenytoin	Injeksion: 50 mg/ mL in 5- mL flakon (natrium)		H(S/T), PP	N03AB02
	Tretësirë orale: 25 mg - 30 mg/5 mL		H(S/T), PP	
	Format e forta orale: 50 mg (natrium)		H(S/T), PP	

valproic acid (natrium valproate)	Tretësirë orale: 50 mg/ mL		H(S/T), PP	N03AG01
	Pika: 300 mg/mL		H(S/T), PP	
	Forma të forta orale: 300 mg, 500 mg (natrium valproate)		H(S/T), PP	
levetiracetam	Tableta: 250mg, 500mg		H(S/T), PP	N03AX14
pyridostigmine	Tableta: 60 mg		H(S/T), PP	N07AA02
6. BARNAT ANTI-INFEKTIVE				
6.1 Anthelmintikët				
6.1.1 Anthelmintikët intestinal				
mebendazole	Tableta (përthypëse): 100 mg Suspension oral: 100mg/ 5 mL		ISHSP	P02CA01
6.2.1 ANTIBIOTIKËT E GRUPIT ACCESS				
amikacin	Injeksion: 250 mg (si sulfat)/mL në flakon 2- mL		H(S/T)	J01GB06
amoxicillin	Pluhur për tretësirë orale: 125 mg (si trihidrat)/5 mL, 250 mg (si trihidrat)/5 mL		ISHSP	J01CA04
	Format e forta orale: 500 mg (si trihidrat)		ISHSP	
	Pluhur për injeksion: 1 g (si natrium) në flakon		ISHSP	
amoxicillin+clavulonic acid	Tretësirë orale: 125 mg amoxicillin + 31.25 mg clavulanic acid/5 mL, 250 mg amoxicillin + 62.5 mg clavulanic acid/5 mL		ISHSP	J01CR02
	Tableta: 500 mg (si trihidrat) + 125 mg (si kripë kaliumi)		ISHSP	
ampicillin	Pluhur për injeksion: 500 mg; 1 g (si kripë natriumi) në flakon		ISHSP	J01CA01
benzathine benzylpenicillin	Pluhur për injeksion: 900 mg benzylpenicillin (= 1.2 million IU) në flakon 5- mL [c]; 1.44 g benzylpenicillin (= 2.4 million IU) në flakon 5- mL		ISHSP	J01CE08
benzylpenicillin	Pluhur për injeksion: 600 mg (= 1 million IU); 3 g (= 5 million IU) (kripë e natriumit ose kaliumit) në flakon		ISHSP	J01CE01

cefalexin	Pluhur për tretje me ujë: 125 mg/ 5 mL; 250 mg/5 mL (anhidroze)		ISHSP	J01DB04
	Format orale të forta: 500 mg (si monohidrat)		ISHSP	
cefazolin a	Pluhur për injeksion: 1 g (si kripë e natriumit) në flakon		ISHSP	J01DB04
	a >1 muaj			
chloramphenicol	Pluhur për injeksion: 1 g në flakon		H(S/T)	J01BA01
clindamycin	Kapsula: 300 mg (si hidroklorur)		ISHSP	J01FF01
	Injeksion: 150 mg (si fosfat)/ mL		H(S/T), PP	
	Tretësirë orale: 75 mg/5 mL (si palmitat)		ISHSP	
cloxacillin*	Kapsula: 500 mg (si kripë e natriumit)		ISHSP	J01CF02
	Pluhur për injeksion: 500 mg (si kripë e natriumit) në flakon		H(S/T)	
	Pluhur për tretësirë orale: 125 mg (si kripë e natriumit)/5 mL		ISHSP	
	*Cloxacillin, dicloxacillin and flucloxacillin preferohen për përdorim oral për shkak të absorbimit më të mirë		ISHSP	
doxycycline a	Tretësirë orale: 50 mg/5 mL (anhidroze)		ISHSP	J01AA02
	Format e forta orale: 100 mg		ISHSP	
	a Përdorimi te fëmijët nën 8 vjeç vetëm nëse ka infeksion që kërcënon jetën dhe nuk ka alternativë tjetër terapeutike		H(S/T)	
gentamicin	Injeksion: 10 mg, 40 mg, 60 mg (si sulfat)/ mL në flakon 2- mL		ISHSP	J01GB03
metronidazole	Injeksion: 500 mg në flakon 100- mL		H(S/T)	J01XD01
	Tretësirë orale: 200 mg (si benzoate)/5 mL		ISHSP	
	Supozitorë/vaginaleta: 500 mg, 1 g		ISHSP	
	Tableta: 200 mg to 500 mg		ISHSP	
nitrofurantoin	Tretësire orale: 25 mg/5 mL		ISHSP	J01XE01
	Tableta: 100 mg		ISHSP	

phenoxymethylpenicillin	Pluhur për tretësirë orale: 250 mg (si kripë kaliumi) /5 mL		ISHSP	J01CE02
	Tableta: 1 milion IU			
procaine benzylpenicillin*	Pluhur për injeksion: 1 g (=1 million IU), 3 g (=3 million IU) në flakon		ISHSP	J01CE09
	*Procaine benzylpenicillin nuk rekomandohet si terapi e zgjedhjes së parë te sepsa neonatale, përveç institucioneve që kanë shkallë të lartë të vdekshmërisë së foshnjave			
sulfamethoxazole + trimethoprim*	Injeksion: 80 mg + 16 mg/ mL në ampullë		H(S/T)	J01EE01
	Tretësirë orale: 200 mg + 40 mg/5 mL		ISHSP	
	Tableta: 400 mg + 80 mg		ISHSP	
	*Trimetoprima si agjens i vetëm mund të jetë alternativë e infeksioneve të traktit të poshtëm urinar			
6.2.2. ANTIBIOTIKËT E GRUPIT WATCH				
azithromycin	Forma të forta orale: 500 mg (anhidroze)		ISHSP	J01FA10
	Tretësire orale: 200 mg/5 mL		ISHSP	
	Pluhur për tretësirë për infuzion*: 500 mg *Indikacioni: për trajtimin e pacientëve në mjekimet intensive të SHSKUK		H(S/T)	
cefixime	Forma të forta orale: 400 mg (si trihidrat)		ISHSP	J01DD08
	Pluhur për tretësirë orale: 100 mg/ 5 mL		ISHSP	
cefotaxime	Pluhur për injeksion: 250 mg për flakon (si kripë natriumi)		ISHSP	J01DD01
ceftriaxone	Pluhur për injeksion: 250 mg; 1 g (si kripë e natriumit) në flakon		ISHSP	J01DD04
cefuroxime	Pluhur për injeksion: 250 mg, 750 mg, 1.5 g në flakon (si kripë e natriumit)		ISHSP	J01DC02
ciprofloxacin	Tretësirë për infuzion IV: 2 mg/mL		H(S/T)	J01MA02
	Tableta: 500 mg		ISHSP	
	Format e forta orale: 500 mg		ISHSP	

clarithromycin†	Pluhur për tretësirë orale: 125 mg/5 mL, 250 mg/5 mL		ISHSP	J01FA09
	Pluhur për injeksion: 500 mg në flakon		ISHSP	
	*Eritromicina mund të jetë alternativë		ISHSP	
	† Klaritromicina po ashtu është e listuar për përdorim në regjim të kombinuar për eradikimin e <i>H. pylori</i> tek të rriturit		ISHSP	
piperacillin + tazobactam+	Pluhur për injeksion: 2 g (si kripë e natriumit) + 250 mg (si kripë e natriumit), 4 g (si kripë e natriumit) + 500 mg (si kripë e natriumit) në flakon		H(S/T)	J01CR05
vancomycin	Kapsula: 125 mg; 250 mg (si hidroklorur)		ISHSP	J01XA01
	Injeksion+: 500 mg		H(S/T)	
teicoplanin+	Pluhur për tretësirë për injeksion: 200 mg Indikacioni: infeksionet rezistente me bakterie gram pozitive (bazi ipet vetëm me antibiogram dhe përmes konziliumit të tre specialistëve të fushës në nivelin terciar)		H(S/T)	
ceftazidime	Pluhur për injeksion: 250 mg, 1 g (si pentahidrat) në flakon		ISHSP	J01DD02
imipenem + cilastatin+	Pluhur për tretësirë për infuzion: 500 mg + 500 mg		H(S/T)	J01DH51
meropenem+ a	Pluhur për injeksion: 500 mg (si trihidrat); 1 g (si trihidrat) në flakon		H(S/T)	J01DH02
	a > 3 muaj		H(S/T)	
eritromicina	Granula për suspension: 250 mg/5 mL		ISHSP	J01FA01
	Tretësirë për injeksion: 500 mg, 1 g		ISHSP	
(+: Këto barna ipen vetëm me antibiogram dhe përmes konziliumit të tre specialistëve të fushës (ku njëri nga anëtarët e konziliumit është specialist infektolog ose mikrobiolog)				
6.2.3. Grupi Rezervë*				
Cefalosporinat e gjeneratës së pestë (me ose pa inkibitor të beta-laktamazës) p.sh. ceftaroline	Pluhur për injeksion: 400 mg, 600 mg (si fosamil) në flakon			
Cefalosporinat e gjeneratës së katërt (me ose pa inkibitor të beta-laktamazës) p.sh. cefepime	Pluhur për injeksion: 500 mg, 1 g, 2 g (si hidroklorur) në flakon			
Kolistina	Pluhur për injeksion: 1 million I.U. (si kolistemetat natrium) në flakon			J01XB01
Ceftazidime + avibactam	Pluhur për injeksion: 2 g+0.5 g në flakon			J01DD52

Polymixin B	Pluhur për injeksion: 500 000 I.U. në flakon		J01XB02
Fosfomycin	Pluhur për injeksion: 2 g (natrium), 4 g (natrium) në flakon		J01XX01
Meropenem + vaborbactam	Pluhur për injeksion: 1 g+1 g në flakon		J01DH52
Plazomicin	Injeksion: 500 mg për 10 mL në flakon		J01GB14
Linezolid	Tretësirë për infuzion: 2 mg/mL në qese prej 300 mL		J01XX08
*Këto barna ipen vetëm me antibiogram dhe përmes konziliumit të tre specialistëve të fushës në nivelin terciar, H(T)			
6.2.4 Barnat antileprotike			
dapsone	Tableta: 50 mg	H(S/T), PP	J04BA02
6.2.5 Barnat antituberkulare			
ethambutol	Tretësirë orale: 25 mg/mL	H(S/T), PP	J04AK02
	Tableta: 100 mg to 400 mg (hidroklorur)	H(S/T), PP	
isoniazid	Tretësirë orale: 50 mg/5 mL	H(S/T), PP	J04AC01
	Tableta: 100 mg to 300 mg	H(S/T), PP	
	Tableta (ndarëse): 50 mg	H(S/T), PP	
rifampicine	Tableta: 150 mg	H(S/T), PP	J04AB02
isoniazid + rifampicin	Tableta:	H(S/T), PP	J04AM02
	75 mg + 150 mg; 150 mg + 300 mg	H(S/T), PP	
	60 mg + 60 mg (Për përdorim të herë pas hershëm 3 herë në javë)	H(S/T), PP	
	150 mg + 150 mg (për përdorim të herë pas hershëm 3 herë në javë)	H(S/T), PP	
	Tableta (disperzibile): 50 mg + 75 mg	H(S/T), PP	
pyrazinamide	Tretësirë orale: 30 mg/mL	H(S/T), PP	J04AK01
	Tableta: 400 mg	H(S/T), PP	
	Tableta (dispersibile): 150 mg	H(S/T), PP	
	Tableta (ndarëse): 150 mg	H(S/T), PP	
capreomycin	Injeksion: 1 g (si sulfat) në flakon	H(S/T), PP	J04AB30
cycloserine*	Format e forta orale: 250 mg	H(S/T), PP	J04AB01
	*Terizidone mund të jetë një alternativë	H(S/T), PP	
ethionamide*	Tableta: 125 mg; 250 mg	H(S/T), PP	J04AD03
	*Protionamide mund të jetë një alternativë	H(S/T), PP	
levofloxacin	Tableta: 500 mg Tretësirë për infuzion: 500 mg/100 mL	H(S/T), PP	J01MA12

p-aminosalicylic acid	Granula: 4 g në qeska		H(S/T), PP	J04AA01
	Tableta: 500 mg		H(S/T), PP	
			H(S/T), PP	
streptomycin	Pluhur për injeksion: 1 g (si sulfat) në flakon		H(S/T), PP	J01GA01
tuberculin purified protein derivative, (PPD-S)	Sol për diag. 5 TU/0.1mL, 0.1 mL SC		H(S/T)	V04CF01
6.3 Barnat antimikotike				
amphotericin B (liposomal)*	Pluhur koncentrat për infuzion: 50 mg Indikacioni: format e rënda të mykozave sistemike multirezistente *Bari ipet përmes konziliumit të tre specialistëve të fushës		H(T)	J02AA01
fluconazole	Kapsula: 150 mg, 200 mg		ISHSP	J02AC01
	Injeksion: 2 mg/mL në flakon		H(S/T)	
	Tretësirë orale: 50 mg/5 mL		ISHSP	
itraconazole	Kapsula: 100 mg		ISHSP	J02AC02
	Tretesirë orale: 10 mg/mL		ISHSP	
nystatin	Tretesirë orale: 100 000 IU/mL		ISHSP	A07AA02
	Tableta: 100 000 IU; 500 000 IU		ISHSP	
	Ovula: 100 000 IU		ISHSP	G01AA01
voriconazole	Tableta: 50 mg, 200 mg		H(S/T), PP	J02AC03
	Pluhur për injeksion: 200 mg në flakon		H(S/T)	
	Pluhur për tretësirë orale: 40 mg/ mL		H(S/T), PP	
6.4 Barnat antivirale				
6.4.1 Barnat antiherpetikë				
aciclovir	Tretësirë orale: 200 mg/5 mL		ISHSP	J05AB01
	Pluhur për injeksion: 250 mg (si kripë natriumi) në flakon		H(S/T)	
	Tableta: 200 mg		ISHSP	
imiquimod	Kremë: 5 mg/100 mg-5%		ISHSP	D06BB10
6.4.2 Antiretroviralët				
didanosine	Tableta: 400 mg		H(T), H(amb)	J05AF02
tenofovir+ emtricitabine	Tableta: 300 mg (disoproxil fumarate ekuivalent to 245 mg tenofovir disoproxil) + 200mg		H(T), H(amb)	J05AR17
6.4.2.1 Frenuesit e transkriptazës reverse nukleoseide/Nukleotide				
abacavir (ABC)	Tableta: 300 mg (si sulfat).		H(T), H(amb)	J05AF06
	Tableta (dispersible, ndarëse): 60 mg (si sulfat)		H(T), H(amb)	
lamivudine (3TC)	Tretesirë orale: 50 mg/5 mL		H(T), H(amb)	J05AF05
	Tretesirë orale: 150 mg		H(T), H(amb)	
6.4.2.2 Frenuesit e transkriptazes reverse jo-Nukleoside				
efavirenz (EFV or EFZ) a	Tableta: 200 mg (ndarëse), 600 mg		H(T), H(amb)	J05AG03
	a >3 vjeç ose >10 kg peshë			

nevirapine (NVP) a	Tretësirë orale: 50 mg/5 mL		H(T), H(amb)	J05AG01
	Tableta (dispersible): 50 mg, 200 mg		H(T), H(amb)	
	a > 6 javë			
6.4.2.3 Frenuesit e proteazës				
darunavir a	Tableta: 75 mg, 400 mg, 600 mg, 800 mg		H(T), H(amb)	J05AE10
	a >3 vite			
lopinavir + ritonavir (LPV/r)	Tretësirë orale: 400 mg + 100 mg/5 mL		H(T), H(amb)	J05AR10
	Tableta (stabile në nxehtësi): 100 mg + 25 mg, 200 mg + 50 mg		H(T), H(amb)	
	Kapsula që përmbajnë peleta orale: 40 mg + 10 mg		H(T), H(amb)	
ritonavir	Tretësirë orale: 400 mg/5 mL		H(T), H(amb)	J05AE03
	Tableta (stabile në nxehtësi): 25 mg, 100 mg		H(T), H(amb)	
6.4.2.4 Frenuesit e integrases				
dolutegravir	Tableta: 50 mg		H(T), H(amb)	J05AX12
Kombinimet me doze-fikse				
abacavir + lamivudine	Tableta (të tretshme, ndarëse): 60 mg + 30 mg; 120 mg + 60 mg, 600 mg + 300 mg		H(T), H(amb)	J05AR02
efavirenz + emtricitabine + tenofovir	Tableta: 600 mg + 200 mg + 300 mg (disoproxil fumarate ekuivalent to 245 mg tenofovir disoproxil)		H(T), H(amb)	J05AR06
lamivudine + zidovudine	Tableta: 30 mg + 60 mg, 150 mg + 300 mg		H(T), H(amb)	J05AR01
6.4.3 Antiviralet tjere				
ribavirin	Injeksion për administrim intravenoz: 800 mg dhe 1 g në 10- mL		H(T)	J05AP01
	Format e forta orale: 200 mg, 400 mg		H(S/T), PP	
valganciclovir	Tableta: 450 mg		H(S/T), PP	J05AB14
oseltamivir	Kapsula: 30 mg, 75 mg (si fosfat)		ISHSP	J05AH02
	Oral pluhur: 12 mg/ mL		ISHSP	
6.4.4 Barnat kundër hepatitit				
6.4.4.1 Barnat për hepatit B				
6.4.4.1.1 Frenuesit e transkriptazës reverse Nukleoside/Nukleotide				

tenofovir disoproxil fumarate (TDF)	Tableta: 300 mg (tenofovir disoproksil fumarat – ekuivalent me 245 mg tenofovir disoproxil)		H(T), H(amb)	J05AF07
6.4.4.2 Barnat për hepatit C				
Ledispavir/Sofosbuvir	Tableta: 90 mg/400 mg		H(T), H(amb)	J05AX65
Sofosbuvir/Velpatasvir	Tableta: 400 mg/100 mg		H(T), H(amb)	J05AX69
Glecaprevir/pibrentasvir	Tableta: 100 mg/40 mg		H(T), H(amb)	J05AP57
7. ANTINEOPLASTIKËT DHE IMUNOSUPRESORET				
7.1 Barnat imunosupresore				
azathioprine	Tableta (ndarëse): 50 mg		H(S/T), PP	L04AX01
ciclosporine	Kapsula: 25 mg, 50 mg		H(S/T), PP	L04AD01
	Koncentrat për injeksion: 50 mg/ mL në ampulla 1 mL për transplantim të organeve		H(T)	
	Tretësirë orale: 100 mg/1 mL, 50 mL		H(S/T), PP	
etanercept	Injeksion: 25 mg Indikacionet: artriti juvenil idiopatik, artriti reumatoid (te i cili ka dështuar terapia standarde), spondiliti ankilozant (te i cili ka dështuar terapia standarde), forma e rëndë e psoriazës pllakore kronike		H(T)	L04AB01
infliximab	Injeksion: 100 mg Indikacionet: forma e rëndë e sëmundjes të Crohn-it, artriti reumatoid (te i cili ka dështuar terapia standarde), artriti psoriatic (te i cili ka dështuar terapia standarde), spondiliti ankilozant		H(T)	L04AB02
abatacept*	Koncentrat pluhur për tretësirë për infuzion: 250 mg Indikacioni: forma e rëndë e artritit juvenil poliartikular *Ky bari është në konceptdokumentin për sëmundje të rralla		H(T)	L04AA24
mycophenolate natrium	Tableta: 180 mg, 360 mg		H(amb)	L04AA06
thalidomide	Tableta: 100 mg, 200 mg		H(amb)	L04AX02
tacrolimus	Kapsula: 0.5 mg, 1 mg, 3 mg		H(amb)	L04AD02
mycophenolate mofetil	Format e forta orale: 250 mg, 500 mg		H(amb)	L04AA06
tocilizumab	Koncentrat për tretësirë për infuzion: 200 mg/10 mL Shiringë e parambushur (për rastet pediatrike): 162 mg/0.9 mL Indikacionet: artriti reumatoid rezistent në terapinë standarde, artriti juvenil sistemik idiopatik rezistent në terapinë standarde		H(T)	L04AC07
leflunomide	Tableta: 20 mg Indikacionet: artriti reumatoid dhe psoriatic, spondiliti ankilozant		H(T)	L04AA13
eculizumab*	Koncentrat për tretësirë për infuzion: 10 mg/ mL, 30 mL Indikacioni: HUS atipik *Ky bari është i përfshirë në konceptdokumentin për sëmundje të rralla		H(T)	L04AA25

adalimumab*	Tretësirë për injeksion në shiringë të parambushur: 40 mg Indikacioni: morbus Crohn te rastet pediatrike (në rast se ka dështuar terapia standarde), artriti kronik juvenil idiopatik me uveit (në rastet kur ka dështuar terapia standarde) *Ky bari është i përfshirë në konceptdokumentin për sëmundje të rralla		H(T)	L04AB04
vedolizumab	Pluhur për koncentrat për tretësirë për infuzion: 300 mg Indikacioni: koliti ulçeröz (në rast se ka dështuar terapia standarde)		H(T)	L04AA33
secukinumab	Tretësirë për injeksion në shiringë të parambushur: 150 mg/1 mL Indikacionet: artriti psoriatik (në rast se ka dështuar terapia standarde), spondiliti ankilozant (në rast se ka dështuar terapia standarde), forma e rëndë e psoriazës pllakore (në rast se ka dështuar terapia standarde)		H(T)	L04AC10
7.2 Barnat citotoksike dhe adjuvante				
all-trans retinoid acid (ATRA)	Kapsula: 10 mg		H(T)	L01XX14
	Indikacioni: leukemia akute promielocitare		H(T)	
azacitidine*	Tableta: 300 mg Pluhur për suspension për injeksion: 100 mg (25 mg/mL) Indikacioni: MDS RAEB 2, AML te pacientët me moshë 60 vjeç e më tepër në periudhën post-induktive të cilët më parë kanë marrë terapi intensive dhe kane pasur përgjigje të plotë ndaj terapisë, por që nuk kane mundur të marrin terapi në konsoliduese (një pjesë apo tërë terapi në konsoliduese).		H(T)	L01BC07
bortezomib	Injeksion: 3.5 mg Indikacioni: myeloma multiple		H(T)	L01XX32
asparaginase	Pluhur për injeksion: 10 000 IU në flakon		H(T)	L01XX02
	Indikacioni: leukemia akute limfoblastike		H(T)	
bleomycin	Pluhur për injeksion: 15 mg (si sulfat) në flakon Indikacionet: Limfoma Hodgkin Sarkoma Kaposi Tumori vezoreve i qelizave germ Tumori germ qelizor i testikujve		H(T), H(amb)	L01DC01
calcium folinate	Injeksion: 3 mg/ mL në 10- mL ampullë Indikacionet: Kanceri i kolonit i fazave të hershme Kanceri i rektumit i fazave të hershme Neoplazia trofoblastike gjestative Kanceri kolorektal metastatik Osteosarkoma Limfoma Burkitt		H(T)	V03AF03
capecitabine	Tableta: 500 mg Indikacionet: Kanceri i kolonit i fazave të hershme Kanceri i rektumit i fazave të hershme Kanceri metastatik i gjirit		H(T), H(amb)	L01BC06
	Kanceri kolorektal metastatik			

carboplatin	Injeksion: 50 mg/5 mL, 150 mg/15 mL, 450 mg/45 mL, 600 mg/60 mL		H(T), H(amb)	L01XA02
	Indikacionet: Kanceri i gjirit i fazave të hershme Kanceri epitelial i ovarëve Kanceri nazofaringeal Kanceri i mushkërive në qeliza jo të vogla Osteosarkoma Retinoblastoma			
chlorambucil	Tableta: 2 mg		H(amb)	L01AA02
	Indikacioni: leukemia kronike limfocitare			
cisplatin	Injeksion: 50 mg/50 mL, 100 mg/100 mL		H(T), H(amb)	L01XA01
	Indikacionet: Kanceri cervical Kanceri i kokës dhe qafës Kanceri nazofaringeal Kanceri i mushkërive në qeliza jo të vogla Osteosarkoma Tumori vezoreve i qelizave germ Tumori germ qelizor i testikujve			
cyclophosphamide	Pluhur për injeksion: 500 mg në flakon		H(T), H(amb)	L01AA01
	Indikacionet: Leukemia kronike limfocitare Limfoma difuze e qelizave B të mëdha Kanceri i gjirit i fazave të hershme Neoplazia trofoblastike gjestative Limfoma Hodgkin Limfoma folikulare Rhabdomiosarkoma Sarkoma Ewing Leukemia akute limfoblastike Limfoma Burkitt Kanceri metastatik i gjirit			
	Pluhur për injeksion: 100 mg në flakon			

cytarabine	Indikacionet: Leukemia akute mielogjene Leukemia akute limfoblastike Leukemia akute promielocitare Limfoma Burkitt		H(T)	L01BC01
epirubicine	Koncentrat për tretësirë për infuzion: 2 mg/ mL, 50 mL Indikacioni: te pacientët në kemoterapi të cilët vuajnë nga pamjaftueshmëria e zemrës me moshë mbi 60 vjeç		H(T), H(amb)	L01DB03
dacarbazine	Pluhur për injeksion: 100 mg në flakon Indikacionet: limfoma Hodgkin, melanoma malinje		H(T), H(amb)	L01AX04
dactinomycin	Pluhur për tretësirë për injeksion: 500 mcg Indikacionet: sarcoma Ewing, rhabdomyosarcoma, tumori Wilms		H(T), H(amb)	L01DA01
dasatinib	Tableta: 100 mg, 140 mg Indikacioni: leukemia mieloide kronike rezistente në imatinib		H(amb)	L01XE06
daunorubicin	Pluhur për injeksion: 50 mg (hidroklorur) në flakon Indikacioni: Leukemia akute limfoblastike Leukemia akute mielogjene Leukemia akute promielocitare		H(T)	L01DB02
docetaxel	Injeksion: 20 mg/mL, 40 mg/mL Indikacionet: Kanceri i gjirit i fazave të hershme Kanceri i mushkërive Kanceri i vezoreve Kanceri i nazofaringut Kanceri i lukthit Kanceri metastatik i gjirit Kanceri metastatik i prostatës		H(T), H(amb)	L01CD02
doxorubicin	Pluhur për Injeksion: 10 mg, 50 mg (hidroklorur) në flakon Indikacionet: kanceri i gjirit, kanceri i gjëndrës tiroide, kanceri i lukthit		H(T), H(amb)	L01DB01
etoposide	Injeksion: 20 mg/ mL in 5- mL ampullë Indikacionet: kanceri i mushkërive, tumori germ-qelizor i testikujve, tumori germ-qelizor i ovareve		H(T), H(amb)	L01CB01

filgrastim	Injeksion: 120 mcg, 300 mcg, 480 mcg në shiringe të para-mbushur Origjinatorë ose biosimilarë Indikacionet: Profilaksa primare te pacientët me rrezik për të zhvilluar neutropeni febrile të shoqëruar me kemoterapi mielotoksike. Profilaksa sekondare te pacientët të cilët kanë zhvilluar neutropeni pas kemoterapisë mielotoksike Për të lehtësuar administrimin e regjimeve me kemoterapi		H(T), H(amb)	L03AA02
pegfilgrastim	Tretësirë për injeksion me shiringë të parambushur: 6 mg/0.6 mL Indikacioni: te aplazioni i rëndë i palcës kockore pas kemoterapisë agresive Origjinatorë ose biosimilarë		H(T)	L03AA13
fludarabine	Pluhur për injeksion: 50 mg (fosfat) në flakon Indikacioni Leukemia kronike limfocitare		H(T)	L01BB05
5-fluorouracil	Injeksion: 50 mg/mL në ampulla 5- mL, 50 mg/mL, 20 mL Indikacionet: Kanceri i gjirit i fazave të hershme Kanceri i kolonit i fazave të hershme Kanceri i rektumit i fazave të hershme Kanceri kolorektal metastatik Kanceri nazofaringeal		H(T)	L01BC02
gemcitabine	Pluhur për injeksion: 200 mg në flakon, 1 g në flakon Indikacionet: Kanceri epitelial i owareve NSLC Kanceri i pankreasit Kanceri i rrugëve biliare Kanceri i gjirit Kancerët hematologjikë		H(T), H(amb)	L01BC05
goserelin	Implant, shiringë e mbushur: 10.8 mg, 3.6 mg		H(T), H(amb)	L02AE03
anagrelide	Format e forta orale: 0.5 mg		H(T), H(amb)	L01XX35
hydroxycarbamide	Format e forta orale: 500 mg Format e forta orale: 1 g Indikacionet: leukemia kronike mieloide, polycythemia rubra vera thrombocytaemia essentialis, hiperleukocitoza te leukemitë akute		H(T), H(amb)	L01XX05

ifosfamide	Pluhur për Injeksion: 500 mg flakon, 1 g flakon Indikacionet: Tumori germ qelizor i testikujve Tumori vezoreve i qelizave germ Osteosarkoma Rhabdomiosarkoma Sarkoma Ewing Salvage therapy te limfomat non-Hodgkin		H(T), H(amb)	L01AA06
imatinib*	Tableta: 400 mg Indikacionet: Leukemia kronike mieloide, tumori stromal gastrointestinal *Ilaçi futet në terapi në bazë të mendimit të tre mjekëve nga Klinika e Onkologjisë dhe Radioterapisë në Prishtinë (QKUK), si dhe duhet te vlerësohet efekti i terapisë dhe gjendja klinike e pacientit, në çdo 4 cikle.		H(T), H(amb)	L01XE01
irinotecan	Koncentrat për tretësirë për infuzion: 40 mg/2 mL (në flakon 2- mL) Koncentrat për tretësirë për infuzion: 100 mg/5 mL (në flakon 5- mL)		H(T), H(amb)	L01XX19
	Koncentrat për tretësirë për infuzion: 300 mg/15 mL		H(T), H(amb)	
	Indikacioni: kanceri kolorektal metastatik			
mercaptopurine	Tableta: 50 mg Indikacionet: leukemia akute limfoblastike, leukemia akute promielocitare		H(T), H(amb)	L01BB02
mesna	Injeksion: 100 mg/ mL në ampulla 4- mL		H(T)	V03AF01
	Tableta: 400 mg Indikacionet: Tumori germ qelizor i testikujve Tumori vezoreve i qelizave germ Osteosarkoma Rhabdomiosarkoma Sarkoma Ewing		H(T), H(amb)	
methotrexate	Pluhur për injeksion: 50 mg, 1 g (si kripë natrium) në flakon		H(T)	L01BA01
	Tableta: 2.5 mg, 10mg (si kripë natriumi)		H(S/T), H(amb)	
	Indikacionet: Kanceri i gjirit i fazave të hershme Neoplazia trofoblastike gjestative Osteosarkoma Leukemia akute limfoblastike Leukemia akute promielocitare Indikacionet reumatologjike			
melfalan	Tableta: 2 mg		H(T), H(amb)	L01AA03
nilotinib	Kapsula: 200 mg		H(T), H(amb)	L01XE08
	Indikacioni: leukemia mieloide kronike rezistente në Imatinib			
	Pluhur për inieksion: 50 mg, 100 mg në flakon			

oxaliplatin			H(T), H(amb)	L01XA03
	Indikacionet: Kanceri i kolonit i fazave të hershme Kanceri kolorektal metastatik			
paclitaxel	Pluhur për injeksion: 30 mg (6 mg/mL); 100 mg (6 mg/mL); 300 mg (6 mg/mL) Indikacionet: Kanceri epitelial i ovareve Kanceri i gjirit i fazave të hershme Kanceri metastatik i gjirit Sarkoma Kaposi Kanceri nazofaringeal Kanceri i mushkërive në qeliza jo të vogla Tumori vezoreve i qelizave germ		H(T), H(amb)	L01CD01
pemetrexed	Injeksion: 100 mg, 500 mg Indikacionet: mezotelioma malinje, NSCLC		H(T), H(amb)	L01BA04
procarbazine	Kapsula: 50 mg (si hidroklorur)		H(T), H(amb)	L01XB01
ruxolitinib	Tableta: 15 mg, 20 mg Indikacionet: mijelofibroza primare me splenomegali, mijelofibroza post policitemia vera me splenomegali, mijelofibroza post trombocitemia esenciale me splenomegali, policitemia vera e cila nuk ka reaguar ndaj hidroksiuresë, graft vs host disease e cila është rezistente ndaj steroideve		H(T), H(amb)	L01EJ01
sirolimus	Tabletë: 1 mg		H(T), H(amb)	L04AA10
carfilzomib*	Pluhur për tretësirë për infuzion: 10mg/ 5 mL, 30 mg/15 mL Indikacioni: forma relaps/refraktare e mijelomës multiple *Ky bari është i përfshirë në konceptdokumentin për sëmundje të rralla		H(T)	L01XG02
obinutuzumab	Koncentrat për tretësirë për infuzion: 1000 mg Indikacioni: limfoma kronike limfocitare te personat mbi moshën 70 vjeç dhe me komorbiditete		H(T)	L01FA03
rituximab	Koncentrat për tretësirë për infuzion: 100 mg/10 mL in 10- mL flakon, 500 mg/50 mL in 50- mL flakon Tretësirë për injeksion SC: 1400mg/11.7 mL Origjinatori dhe biosimilari Indikacionet: Limfoma difuze e qelizave B të mëdha Leukemia kronike limfocitare Limfoma folikulare Forma e rëndë e pemfigus vulgaris (foliaceus dhe bulloze)		H(T)	L01XC02
tioguanine	Format e forta orale: 40 mg Indikacioni: leukemia akute limfoblastike		H(T), H(amb)	L01BB03

sorafenib*	Tableta: 200 mg Indikacionet: karcinoma hepatocelulare, karcinoma e qelizave renale, karcinoma e gjëndrës tiroide *Ilaçi futet në terapi në bazë të mendimit të tre mjekëve nga Klinika e Onkologjisë dhe Radioterapisë në Prishtinë (QKUK), si dhe duhet të vlerësohet efekti i terapisë dhe gjendja klinike e pacientit, në çdo 4 cikle.		H(T), H(amb)	L01XE05
sunitinib*	Tableta: 50 mg Indikacionet: karcinoma e veshkave e avancuar ose metastatike *Ilaçi futet në terapi në bazë të mendimit të tre mjekëve nga Klinika e Onkologjisë dhe Radioterapisë në Prishtinë (QKUK), si dhe duhet të vlerësohet efekti i terapisë dhe gjendja klinike e pacientit, në çdo 4 cikle.		H(T), H(amb)	L01EX01
tamoxifen	Tableta: 20 mg Indikacioni: karcinoma e gjirit		H(T), H(amb)	L02BA01
trastuzumab*	Pluhur për koncentrat për tretësirë për infuzion: 440 mg Indikacioni: Karcinoma e gjirit me ekspresion të theksuar të HER2 (IHH3+ ose CISH+): 1. si vazhdim i terapisë adjuvante pas kemoterapisë me antracikline (maksimalisht deri në 1 vit), 2. te forma metastatike e sëmundjes për 6-8 cikle, PS 0 ose 1, i kombinuar me taksane, ndërsa në mungesë të progresionit të sëmundjes, të vazhdohet vetëm me trastazumab, 3. forma lokale e sëmundjes me rrezik të lartë për rikthim Origjinatori dhe biosimilari *Ilaçi futet në terapi në bazë të mendimit të tre mjekëve nga Klinika e Onkologjisë dhe Radioterapisë në Prishtinë (QKUK)		H(T), H(amb)	L01XC03

pertuzumab+trastuzumab*	Tretësirë për injeksion SC: 1200 mg/600 mg Tretësirë për injeksion SC: 600 mg/600 mg Indikacionet: Kanceri i gjirit (HER2 pozitiv): a) trajtim neoadjuvant me kimioterapi me taksane, të pacientëve me kancer të gjirit lokalisht të avancuar, inflamator ose në fazë të hershme me një rrezik të lartë të përsëritjes, dhe pas aplikimit të mëparshëm sekuencial të antraciklinave. Në këtë grup pacientësh trajtimi vazhdon edhe pas operacionit, deri në një vit gjithsej, duke përfshirë përdorimin së bashku me trastuzumab në qasjen neoadjuvant b) kanceri i gjirit HER2 pozitiv metastatik- (PS 0-1), terapi e linjës së parë për sëmundje metastatike, në kombinim me docetaxel (6-8 cikle), dhe më pas në mungesë të progresionit të sëmundjes, vazhdon deri në progresionin e sëmundjes c) kanceri i gjirit HER2 pozitiv në fazën e hershme me rrezik të lartë rikthimi, që përkufizohet si kanceri i gjirit me nyjet limfatike pozitive, i kombinuar me trastuzumab dhe kimioterapi, pavarësisht nga lloji i trajtimit fillestar (trajtimi fillestar kirurgjik ose terapia neoadjuvante e ndjekur nga trajtimi kirurgjik), që zgjat deri në një vit gjithsej nga aplikimi i parë i terapisë anti- HER2 *Ilaci futet në terapi në bazë të mendimit të tre mjekëve nga Klinika e Onkologjisë dhe Radioterapisë në Prishtinë (QKUK)		H(T), H(amb)	L01XY02
vinblastine	Pluhur për injeksion: 10 mg (sulfate) në flakon Indikacionet: Limfoma Hodgkin Sarkoma Kaposi Tumori germ qelizor i testikujve Tumori vezoreve i qelizave germ		H(T), H(amb)	L01CA01
vincristine	Pluhur për injeksion: 1 mg (sulfat) në flakon		H(T), H(amb)	L01CA02
vinorelbine	Injeksion: 50 mg/5 mL në flakon 5- mL Indikacionet: NSLC Kanceri metastatik i gjirit		H(T)	L01CA04
zoledronic acid	Koncentrat për tretësirë për infuzion: 4 mg/5 mL në flakon 5- mL		H(T), H(amb)	M05BA08
	Tretësirë për infuzion: 4 mg - 5 mg/100 mL në 100- mL		H(T), H(amb)	
	Indikacion: sëmundje e eshtrave e ndërlidhur me malinjitet			
temozolamide	Forma orale: 100 mg, 140 mg Indikacioni: glioblastoma multiforme		H(T), H(amb)	L01AX03
erlotinib	Tabletë: 100 mg Indikacionet: NSLC-EGFR pozitiv, kanceri i pankreasit		H(T), H(amb)	L01XE03
bendamustine	Pluhur për koncentrat për tretësirë për infuzion: 100 mg (2.5 mg/mL)		H(T)	L01AA09
deferasirox	Tableta: 500 mg		H(T), H(amb)	V03AC03

bevacizumab*	Koncentrat për tretësirë për infuzion: 400 mg/16 mL, 100 mg/4 mL Origjinatori dhe biosimilari Indikacionet: - Trajtimi i pacientëve me kancer kolorektal metastatik (mCRC), (PS 0-1), në trajtimin e linjës së parë, me kimioterapi që përmban fluoropyrimidine - Bevacizumab me kimioterapi standarde me karboplatin dhe paclitaxel për kanceret e vezoreve në stadin FIGO- IIIc (operuar në mënyrë jooptimale dhe inoperabile) dhe stadi FIGO- IV, karcinomat e tubave fallopiane dhe karcinomat primare peritoneale, për paciente femra në gjendje të përgjithshme të mirë (PS 0-1), pa komorbiditete të theksuara dhe pa infiltrim të zorrëve, dhe më pas si monoterapi në mungesë të progresionit në gjithsej 17 cikle - Trajtimi i pacientëve me tumore të trurit (glioblastoma e avancuar ose rekurente) (PS 0-1) *Aprovohet aplikimi i katër cikleve të trajtimit, pas të cilave është i detyrueshëm përpunimi klinik dhe diagnostik me qëllim të vlerësimit të shkallës së përgjigjes së tumorit dhe toleranca e trajtimit. Vazhdimi i trajtimit është i mundur vetëm në rastin e një përgjigje pozitive tumorale ndaj trajtimit (i plotë, i pjesshëm, ose sëmundje e qëndrueshme), deri në progresionin e sëmundjes Ilaçi futet në terapi në bazë të mendimit të tre mjekëve nga Klinika e Onkologjisë dhe Radioterapisë në Prishtinë (QKUK)		H(T), H(amb)	L01XC07
pembrolizumab*	Koncentrat për tretësirë për infuzion: 25 mg/mL, 4 mL Indikacionet: - Trajtimi i melanomës malinje të avancuar ose metastatike tek të rriturit dhe moshat pediatrike (≥ 12 vjeç), si monoterapi (PS 0-1) - Si monoterapi për trajtimin e kancerit metastatik të mushkërive me qeliza jo të vogla (NSCLC) në pacientët e rritur, tumorët e të cilëve shprehin PD-L1 me TPS $\geq 50\%$ dhe kanë ECOG statusi 0-1. - Pembrolizumab i kombinuar me kemoterapi preferohet te pacientët të cilët e shprehin PD-L1 me TPS ≥ 10 deri 50%. - Trajtimi i alveolar soft part sarcoma (ASPS), forma metastatike ose forma e cila nuk mund të trajtohet në mënyrë kirurgjike, te pacientët e rritur dhe pacientët pediatrikë me moshë ≥ 2 vjeç. *Aprovohet aplikimi i katër cikleve të trajtimit, pas të cilave është i detyrueshëm përpunimi klinik dhe diagnostik me qëllim të vlerësimit të shkallës së përgjigjes së tumorit dhe toleranca e trajtimit. Vazhdimi i trajtimit është i mundur vetëm në rastin e një përgjigje pozitive tumorale ndaj trajtimit (i plotë, i pjesshëm, ose sëmundje e qëndrueshme), deri në progresionin e sëmundjes. Ilaçi futet në terapi në bazë të mendimit të tre mjekëve nga Klinika e Onkologjisë dhe Radioterapisë në Prishtinë (QKUK)		H(T), H(amb)	L01FF02

nivolumab*	Koncentrat për tretësirë për infuzion: 10 mg/mL 4 mL, 10 mL Indikacionet: 1. Trajtimi i melanomës malinje të avancuar ose metastatike tek të rriturit, si monoterapi ose e kombinuar (PS 0-1) 2. Terapia e linjës së dytë për karcinomën renale me qeliza të qarta, të avancuar ose metastatike, tumorët e të cilëve shprehin PD-L1 me TPS≥ 10%, me prognozë të mirë ose të ndërmjetme, (PS 0-1) 3. Si monoterapi ose e kombinuar për trajtimin e kancerit metastatik të mushkërive me qeliza jo të vogla (NSCLC) në pacientët e rritur, tumorët e të cilëve shprehin PD-L1 me TPS≥ 10% dhe kanë (PS 0-1) *Aprovohet aplikimi i katër cikleve të trajtimit, pas të cilave është i detyrueshëm përpunimi klinik dhe diagnostik me qëllim të vlerësimit të shkallës së përgjigjes së tumorit dhe toleranca e trajtimit. Vazhdimi i trajtimit është i mundur vetëm në rastin e një përgjigje pozitive tumorale ndaj trajtimit (i plotë, i pjesshëm, ose sëmundje e qëndrueshme), deri në progresionin e sëmundjes Ilaçi futet në terapi në bazë të mendimit të tre mjekëve nga Klinika e Onkologjisë dhe Radioterapisë në Prishtinë (QKUK)		H(T), H(amb)	L01FF01
fedratinib*	Kapsula: 100 mg Indikacioni: mijelofibroza primare ose sekondare me splenomegali e cila ka dështuar ndaj trajtimit me ruxolitinib *Ky bari është në konceptdokumentin për sëmundje të rralla		H(T), H(amb)	L01EJ02
7.3 Hormonet dhe antihormonet				
anastrozole	Tableta: 1 mg Indikacionet: Kanceri i gjirit i fazave të hershme, Kanceri metastatik i gjirit		H(T), H(amb)	L02BG03
bicalutamide	Tableta: 50 mg Indikacioni: kanceri metastatik i prostatës		H(T), H(amb)	L02BB03
BCG	Për përdorim intravesikal: 81 - 100 mg		H(S/T)	L03AX03
dexamethasone	Injeksion: 4 mg/mL në ampullë 1 mL (as dinatrium fosfat salt)		ISHSP	H02AB02
	Injeksion: 4 mg/mL në ampullë 2 mL (as dinatrium fosfat salt)		ISHSP	
	Tretësirë orale: 2 mg/5 mL		ISHSP	
methylprednisolone	Injeksion: 40 mg/ mL (si sukcinat natriumi) në flakon 1 mL monodozë dhe flakona 5-mL multi- dozë; 80 mg/ mL (si sukcinat natriumi) në flakon monodozë 1 mL, 500 mg dhe 1 g		ISHSP	H02AB04
8. BARNAT KUNDËR PARKINSONIT				
biperiden	Injeksion: 5 mg (lactate) në ampulla 1 mL		H(S/T)	N04AA02
	Tableta: 2 mg (hidroklorur)		H(S/T), PP	
levodopa + o carbidopa	Tableta: 250 mg + 25 mg		H(S/T), PP	N04BA02
9. BARNAT TË CILËT NDIKOJNË NË GJAK				
9.1 Barnat antianemike				
ferrous salt	Tretësirë orale: ekuivalent me 25 mg hekur (si sulfat)/ mL		ISHSP	B03A
	Tableta: ekuivalent me 60 mg hekur		ISHSP	

ferrous salt + folic acid	Tableta: ekuivalent me 90 mg hekur + 1 mg acid folik		ISHSP	B03AD
folic acid	Tableta: 400 mcg, 5 mg		ISHSP	B03BB01
hydroxycobalamin	Injeksion: 1 mg (si acetate, as hidroklorur or si sulfat) në ampullë 1 mL		ISHSP	B03BA03
ferrous fumarate	Kapsula: 350 mg		ISHSP	B03A
ferrous sucrose	Injeksion: 100 mg/5 mL		ISHSP	B03A
erythropoiesis-stimulating agents*	Injeksion, shiringe e para-mbushur		H(S/T)	B03XA
	2000 IU/ 0.3 mL, 30 000IU/ 0.6 mL			
	*vlen për epoetin alfa, beta and theta, darbepoetin alfa 50 mcg, 100 mcg, 300 mcg, methoxy polyethylene glycol-epoetin beta, dhe barnat respektive biosimilare.			
luspatercept*	Pluhur për tretësirë për injeksion: 25 mg, 75 mg Indikacioni: sindroma mijelodisplastike, për trajtimin e anemisë e cila ka dështuar ndaj terapisë me ESA *Ky bari është në konceptdokumentin për sëmundje të rralla		H(T)	B03XA06
9.2 Barnat të cilët ndikojnë në koagulum				
enoxaparin	Injeksion: ampullë ose shiringe e para-mbushur		H(S/T), PP	B01AB
	20 mg/0.2 mL, 40 mg/0.4 mL, 60 mg/0.6 mL Originatori dhe biosimilarët			
heparin natrium	Injeksion: 1000 IU/mL, 5000 IU/mL, 20 000 IU/mL, 25 000 IU/5 mL		H(S/T)	B01AB01
phytomenadione	Injeksion: 1 mg/mL		H(S/T)	B02BA01
	Injeksion: 10 mg/mL në ampullë 5- mL		H(S/T)	
	Tableta: 10 mg		ISHSP	
protamine sulfate	Injeksion: 10 mg/ mL në ampullë 5- mL		H(S/T)	V03AB14
tranexamic acid	Injeksion: 100 mg/ mL		H(S/T)	B02AA02
warfarin	Tableta: 1 mg; 2 mg; 3mg, 5 mg (kripë natriumi)		H(S/T), PP^	B01AA03
acenocoumarol	Tableta: 4 mg		H(S/T), PP^	B01AA07
rivaroxaban	Tableta: 15 mg, 20 mg		H(S/T), PP	B01AF01
iloprost	Injeksion: 20 mcg/mL		H(S/T)	B01AC11
	Indikacionet: hipertensioni pulmonar, sëmundja e Bergerit, ulçerat iskemike			

polidocanol	Injeksion: 0.5% - 3%		H(S/T)	C05BB02
	Indikacioni: terapia e venave varikoze			
desmopressin	Injeksion: 4 mcg/mL (si acetate) në ampullë 1 mL		H(S/T)	H01BA02
	Sprej nazal: 10 mcg (si acetate) për dozë		H(S/T)	
^Produktet me këtë shenjë jipen me përshkrim me dëshminë përkatëse për vlerat e INR				
10. PRODUKTET E GJAKUT ME ORIGJINË HUMANE DHE ZËVENDËSUESIT E PLAZMËS				
10.1 Barnat të cilat derivojnë nga plazma				
Të gjitha barnat të cilat derivojnë nga plazma humane duhet të përputhen me kërkesat sipas OBSH				
10.1.1 Immunoglobulinat humane				
anti-D immunoglobulin	Injeksion: 250 mcg në flakon mono dozë		ISHSP	J06BB01
anti-D immunoglobulin	Injeksion: 300 mcg në flakon mono dozë		ISHSP	J06BB01
anti-rabies immunoglobulin	Injeksion: 150 IU/mL në flakon		ISHSP	J06BB05
anti-tetanus immunoglobulin	Injeksion: 250 IU në flakon		ISHSP	J06BB02
anti-tetanus immunoglobulin	Injeksion: 500 IU në flakon		ISHSP	J06BB02
normal immunoglobulin	Administrim intravenoz: 5% protein tretësirë.**		H(T)	J06BA
	Administrim intravenoz: 10% protein tretësirë.**			
	Administrim subkutan: 15-17% protein tretësirë.*			
	*E indikuar për pamjaftueshmërinë imune primare.			
	**E indikuar për pamjaftueshmërinë imune primare dhe sëmundjen Kawasaki, sindroma Guillain-Barre, trombocitopenitë primare idiopatike			
10.1.2 Barnat të cilat ndikojnë në hemostazë				
kompleks i koncentratit të protrombinës (kombinim i faktorit të koagulimit II, VII, IX, X)	Pluhur dhe tretës për tretësirë për infuzion: 500 IU, 1000 IU Indikacioni: Për trajtimin emergjent të gjakderdhjeve të shkaktuara nga antagonistët e vitaminës K		H(S/T)	B02BD01
coagulation factor VII, recombinant*	Pluhur dhe tretës për tretësirë për injeksion: 2 mg (100 KIU) Indikacioni: deficiencia e faktorit VII te forma rezistente e hemofilisë A *Ky bari është në konceptdokumentin për sëmundje të rralla		H(T)	B02BD08
coagulation factor VIII	Pluhur për injeksion: 500 IU/flakon, 1000 IU/flakon		H(S/T)	B02BD02
coagulation factor VIII, recombinant	500 IU		H(S/T)	
coagulation factor VIII, recombinant	1000 IU		H(S/T)	
coagulation factor IX	Pluhur për injeksion: 500 IU/flakon Pluhur për injeksion: 1000 IU/flakon		H(S/T) H(S/T)	B02BD04
coagulation factor IX, recombinant	Pluhur për injeksion: 500 IU, 1000 IU		H(S/T)	B02BD04

coagulation factor XIII*	Pluhur për injeksion: 1250 IU *Ky bari është i përfshirë në konceptdokumentin për sëmundje të rralla		H(T)	B02BD07
von willebrand factor, recombinant	Pluhur dhe tretësirë për tretësirë për infuzion/injeksion: 10 mg/mL (IV/SC) Pluhur dhe tretësirë për tretësirë për infuzion/injeksion: 30 mg/mL (IV/SC)		H(T)	B02BD06
von willebrand factor	Pluhur dhe tretësirë për tretësirë për infuzion/injeksion: 500 IU, 1000 IU IV		H(T)	
human fibrinogen*	Tretësirë për infuzion/injeksion: 1 g (20 mg/mL) *Fibrinogjeni të përdoret sipas porosive nga klinikat: emergjenca dhe MIQ, kardiokirurgji, kirurgjia vaskulare dhe gjinekologjia		H(T)	B02BB01
F VIII inhibitor bypassing activity	Pluhur dhe tretësirë për tretësirë për infuzion/injeksion: 500 IU		H(T)	B02BD03
emicizumab*	Tretësirë për injeksion SC: 30 mg/1 mL, 60 mg/0.4 mL, 150 mg/mL Indikacioni: forma e rëndë e Hemofilisë A me frenuesit e faktorit VIII (aktiviteti i faktorit VIII <1%), forma e rëndë e Hemofilisë A (me ose pa frenues të faktorit VIII) me 3 ose më tepër nyjëtime të dëmtuara (të dokumentuara me imazheri përkatëse). Ky bari ipet nga konziliumi i mjekëve i përbërë nga specialisti i pediatriisë (kryesues), specialisti i ortopedisë, specialisti i fiziatrisë nga klinikat e QKUK. *Ky bari është i përfshirë në konceptdokumentin për sëmundje të rralla		H(T)	B02BX06
eltrombopag	Tableta: 50 mg Indikacioni: trombocitopenia imune primare kronike (atëherë kur ka dështuar terapia me kortikosteroide dhe imunglobulina)		H(T)	B02BX05
romiplostim*	Tretësirë për injeksion SC: 250 mcg, 500 mcg Indikacioni: trombocitopenia imune primare kronike (atëherë kur ka dështuar terapia me kortikosteroide dhe imunglobulina) *Ky bari është i përfshirë në konceptdokumentin për sëmundje të rralla		H(T)	B02BX04
11. BARNAT KARDIOVASKULARE				
dobutamine	Injeksion: 250 mg/20 mL		H(S/T)	C01CA07
alprostadil	Injeksion: 500 mcg		H(T)	C01EA01
11.1 Barnat antianginoze				
bisoprolol	Tableta: 5 mg		ISHSP	C07AB
	Tableta: 2.5 mg		ISHSP	
metoprolol	Injeksion: 5 mg/5 mL		ISHSP	
glyceril trinitrate	Tableta (sublingual): 0.5 mg		ISHSP	C01DA02
	Tretësirë për infuzion: 5 mg/mL IV		H(S/T)	
	Injeksion: 1 mg/mL, 10 mL		H(S/T)	
	Sprej: 400 mcg		ISHSP	
verapamil	Tableta: 40 mg, 80 mg, 240 mg (hidroklorur) Injeksion: 2.5 mg (hidroklorur)/ mL në ampullë 2- mL		ISHSP	C08DA01

11.2 Barnat antiaritmike				
digoxin	Injeksion: 250 mcg/mL in 2- mL ampullë		H(S/T)	C01AA05
	Tretësirë orale: 50 mcg/mL		H(S/T)	
	Tableta: 250 mcg		H(S/T), PP	
amiodarone	Injeksion: 50 mg/mL në ampullë 3- mL (hidroklorur)		H(S/T)	C01BD01
	Tableta: 200 mg (hidroklorur)		H(S/T), PP	
procainamide	Tretësirë për injeksion: 100 mg/mL Indikacioni: takikardia ventrikulare hemodinamiksht stabile		H(S/T)	C01BA02
propafenone	Injeksion: 3.5 mg/mL		H(S/T)	C01BC03
	Tableta: 150 mg		H(S/T), PP	
adenosine	Injeksion: 3 mg/mL		H(S/T)	C01EB10
11.3 Barnat antihipertenzive				
amlodipine	Tableta: 5 mg, 10 mg		ISHSP	C08CA01
enalapril	Tableta: 5 mg, 10 mg (as hydrogen maleate)		ISHSP	C09AA02
hydralazine	Pluhur për injeksion: 20 mg (hidroklorur) in ampulla		H(S/T)	C02DB01
	Tableta: 25 mg (hidroklorur)		ISHSP	
hydrochlorothiazide	Format e forta orale: 25 mg		ISHSP	C03AA03
methyldopa*	Tableta: 250 mg		ISHSP	C02LB01
	*Methyldopa indikohet për përdorim vetëm në menaxhimin e hipertensionit të shkaktuar nga shtatzënia. Përdorimi për trajtimin e hipertensionit esencial nuk rekomandohet për shkak se barnat tjera kanë efikasitet dhe siguri më të madhe			
losartan	Tableta: 25 mg, 50 mg, 100 mg		ISHSP	C09CA01
sacubutril/valsartan	Tableta: 50 mg (24 mg/26 mg) Indikacioni: pamjaftueshmëria e zembrës me FE të ulur		H(T)	C09DX04
bosentan	Tableta: 62.5 mg Indikacioni: hipertensioni pulmonar primar		H(T)	C02KX01
sildenafil	Tableta: 25 mg Indikacioni: hipertensioni pulmonar		H(T)	G04BE03
11.4 Të tjera				
esmolol	Injeksion: 10 mg/mL, IV		H(S/T)	C07AB09
labetalol	Injeksion: 5 mg/mL, IV		H(S/T)	C07AG01
fentolamine	Injeksion: 5 mg/mL		H(S/T)	C04AB01
phenylephrine	Injeksion: 10 mg/mL		H(S/T)	R01AA04
sodium nitroprusside	Injeksion: 25 mg/mL		H(S/T)	C02DD01
nifedipine	Tableta: 30 mg		ISHSP	C08CA06

simvastatin	Tretësirë për infuzion: 10 mg/50 mL		H(S/T)	
furosemide	Injeksion: 10 mg/mL në ampullë 2- mL		ISHSP	C03CA01
	Tretësirë orale: 20 mg/5 mL		ISHSP	
	Tableta: 40 mg		ISHSP	
spironolactone	Tableta: 25 mg, 50 mg, 100 mg		ISHSP	C03DA01
dopamine	Injeksion: 40 mg/mL (hidroklorur) në flakon 5- mL		H(S/T)	C01CA04
moxonidine	Tableta: 0.4 mg Indikacioni: hipertensioni rezistent (pasi ka dështuar kombinimi me frenues të ACE, bllokatorë të Ca, beta-bllokatorët, diuretikët) te pacientët me pamjaftueshmëri të veshkave të shkallës II-IV		H(T)	C02AC05
11.5 Barnat antitrombocitarë				
11.5.1 Barnat anti-trombocitarë				
clopidogrel	Tableta: 75 mg		ISHSP	B01AC04
tirofiban	Injeksion: 250 mcg/mL		H(S/T)	B01AC17
prasugrel	Tableta: 10 mg		H(S/T), PP	B01AC22
11.5.2 Trombolitikët				
alteplase	Injeksion/infuzion: 50 mg/50 mL		H(S/T)	B01AD02
11.6 Agjentët antilipidikë				
simvastatin	Tableta: 20 mg, 40 mg		ISHSP	C10AA01
atorvastatine	Tableta: 10 mg, 20 mg		ISHSP	C10AA05
fenofibrate	Format e forta orale: 145 mg, 160 mg		ISHSP	C10AB05
ezetimibe	Tableta: 10 mg Indikacionet: te pacienët me LDL>70 mg/dL me rrezik të lartë ose shumë të lartë për ngjarje kardiovaskulare (e kalkuluar sipas HEART score) të cilët janë intolerant ndaj statinave, te pacientët me LDL>70 mg/dL me rrezik të lartë ose rrezik shumë të lartë për ngjarje kardiovaskulare (e kalkuluar sipas HEART score) si shtesë ndaj terapisë me dozë të lartë me statina		H(T)	C10AX09
inclisiran	Tretësirë për injeksion SC: 284 mg/1.5 mL Indikacioni: pacientët me hiperkolesterolemi primare tek të cilët nuk arrihet të kontrollohen vlerat e LDL pas terapisë maksimale me statine ose barna tjere antilipidikë		H(T)	C10AX16
evolocumab*	Tretësirë për injeksion: 140 mg/mL Indikacioni: hiperkolesterolemia familjare *Ky bari është në konceptdokumentin për sëmundje të rralla		H(T)	C10AX13
lomitapide*	Kapsula: 5 mg Indikacioni: hiperkolesterolemia homozigote familjare *Ky bari është në konceptdokumentin për sëmundje të rralla		H(T)	C10AX12
lomitapide*	Kapsula: 10 mg Indikacioni: hiperkolesterolemia homozigote familjare *Ky bari është në konceptdokumentin për sëmundje të rralla		H(T)	C10AX12

12. BARNAT DERMATOLOGJIKE (topikale)				
12.1 Barnat antimikotike				
terbinafine	Kremë: 1%		ISHSP	D01AE15
12.2 Barnat anti-infektive				
mupirocin	Kremë (mupirocin calcium): 2%		ISHSP	D06AX09
silver sulfadiazine a	Kremë: 1%		ISHSP	D06BA01
	a >2 muaj			
12.3 Barnat anti-inflamatore dhe antipruritike				
betamethasone	Kremë ose pomadë: 0.1% (valerat)		ISHSP	D07AC01
hydrocortisone	Kremë ose pomadë: 1% (acetat)		ISHSP	D07AA02
chloropyramine	Pomadë: 1%		ISHSP	D04AA09
12.4 Barnat të cilët ndikojnë në diferencim dhe proliferim të lëkurës				
salicylic acid	Tretësirë: 5%		ISHSP	D01AE12
urea	Kremë ose pomadë: 5%, 10%		ISHSP	D02AE
12.5 Skabicidet dhe pedikulicidet				
permethrin	Gel: 5%		ISHSP	P03AC04
	Losion: 1%		ISHSP	
13. AGJENTËT DIAGNOSTIK				
13.1 Mjetet e kontrastit në radiologji				
barium sulfat	Tretësirë ujore, litra			V08BA
kontrast jojonik 350-400 mg jod/mL	mL		ISHSP	V08B
kontrast jojonik izosmolar 270-320 mg jod/mL	mL		ISHSP	V08B
kontrast paramagnetik 0.5 -1.0 mmol/mL, kontrast paramagnetik i aprovuar nga EMA, FDA	mL		ISHSP	V08C
kontrast për imazhim me ultratingull	deri 5 mL		H(S/T)	V08D
14. DEZINFEKTUESIT DHE ANTISEPTIKËT				
14.1 Antiseptikët				
chlorhexidine	Tretësirë: 5% (diglukonat)		ISHSP	A01AB03
ethanol	Tretësirë: 70% (i denaturuar)		ISHSP	D08AX08
povidone iodine	Tretësirë: 10%		ISHSP	D08AG02
15. DIURETIKËT				
mannitol	Tretësirë e injektueshme: 10%; 20%		ISHSP	B05BC01
16. BARNAT GASTROINTESTINALË				
pancreatic enzymes	Kapsula: 150 mg, 300 mg		ISHSP	A09AA02
L-ornitin L aspartat	Injeksion: 5 g/10 mL		ISHSP	A05BA
ursodeoxycholic acid	Kapsula: 250 mg		ISHSP	A05AA02
macrogol and simethicone	Përdorimi: Obstipacioni, preparatet për endoskopi dhe ekografi		ISHSP	A06AD65

16.1 Barnat antiulçeroze				
omeprazole	Pluhur për injeksion: 40 mg në flakon		ISHSP	A02BC01
	Format e forta orale: 20 mg		ISHSP	
pantoprazole	Pluhur për injeksion: 40 mg në flakon		ISHSP	A02BC02
	Format e forta orale: 40 mg			
16.2 Barnat antiemetike				
dexamethasone	Format e forta orale: 0.5 mg, 4 mg		ISHSP	H02AB02
metoclopramide a	Injeksion: 5 mg (hidroklorur)/ mL në ampullë 2- mL		ISHSP	A03FA01
	Tretësirë orale: 5 mg/5 mL		ISHSP	
	Tableta: 10 mg (hidroklorur)		ISHSP	
	a jo për neonatë			
ondansetron a	Injeksion: 2 mg base/ mL in 2- mL ampulla (hidroklorur)		H(S/T)	A04AA01
	Tretësirë orale: 4 mg/5 mL		H(S/T)	
	Format e forta orale: 8 mg		H(S/T)	
	a >1 muaj			
palonosetron	Tretësirë për injeksion: 250 mcg/ 5 mL Indikacioni: parandalimi i nauzesë dhe vjelljes pas kemoterapisë emetogjene	fortësisht	H(T)	A04AA05
16.3 Barnat anti-inflamatore				
sulfasalazine	Supozitorë: 500 mg		ISHSP	A07EC01
	Tableta: 500 mg		ISHSP	
nifuroxazide	Tretësirë orale: 40 mg/mL		ISHSP	A07AX03
nifuroxazide	Kapsula: 200 mg		ISHSP	A07AX03
16.4 Barnat të cilat përdoren te diarea				
16.4.1 Rehidrimi oral				
oral rehydration salts	Pluhur për tu tretur në: 500 mL; 1 L glucose: 75 mEq natrium: 75 mEq or mmol/L chloride: 65 mEq or mmol/L potassium: 20 mEq or mmol/L citrate: 10 mmol/L osmolarity: 245 mOsm/L glucose: 13.5 g/L natrium chloride: 2.6 g/L		ISHSP	A07CA
	potassium chloride: 1.5 g/L trinatrium citrate dihydrate*: 2.9 g/L *Trinatrium citrat dihidrati mund të zëvendësohet me bikarbonat natriumi 2.5 g/L. Megjithatë pasi stabiliteti i këtij formulimi është shumë i dobët në kondita tropikale rekomandohet vetëm kur prodhohet për përdorim të menjëhershëm		ISHSP	

16.4.2 Barnat per diare				
zinc sulfate	Format e forta orale: 20 mg		ISHSP	A12CB01
17. HORMONET, BARNAT TJERA NË ENDOKRINOLOGJI DHE KONTRACEPTIVËT				
17.1 Hormonet adrenale dhe zëvendësuesit sintetik				
fludrocortisone	Tableta: 100 mcg (acetat)		ISHSP	H02AA02
hydrocortisone	Tableta: 5 mg, 10 mg, 20 mg		ISHSP	H02AB09
somatropin	Shiringa e mbushur: 5-5.5 mg/1-2 mL SC		H(T)	H01AC01
	Shiringë e mbushur: 8-12 mg/mL		H(T)	
	Tretësirë për injeksion (cartridge): 20 mg/ 2.5 mL		H(T)	
17.2 Androgjenet				
testosterone	Injeksion: 100 mg, 250 mg(enanthate) / 1- mL ampullë		H(S/T), PP	G03BA03
cypoterone	Tableta: 50 mg		H(S/T)	G03HA01
triptorelin acetat	Pluhur dhe tretës për suspension: 3.75 mg		H(T)	L02AE04
17.3 Kontraceptivet				
17.3.1 Kontraceptivet oral hormonal				
ethinylestradiol + o levonorgestrel	Tableta: 30 mcg + 150 mcg		H(S/T), PP	G03AA07
testosteron undekanoati	Shiringë e mbushur/Tretësirë yndyrore për injektim: 750 mg/mL si depo preparat		H(S/T)	G03BA03
ciproteron acetati/etinilestradioli	Tableta: 2 mg + 0.035 mg		H(S/T), PP	G03HB01
estradiol	Tableta: 2 mg		H(S/T), PP	G03CA03
17.3.2 Kontraceptivet oral te injektueshem				
medroxyprogesterone acetate	Injeksion (intramuskular): 150 mg/ mL në 1 mL flakon		H(S/T)	G03AC06
17.3.3 Pajisjet intrauterine				
levonorgestrel-releasing intrauterine system	Sistem intrauterin me rezervuar i cili permban 52 mg levonorestel		H(S/T)	G03AC03
17.3.4 Kontraceptivët implantues				
17.4 Estrogjenet				
17.5 Insulinat dhe barnat tjera të cilat perdoren te diabeti melit				
gliclazide	Format e forta orale: 60 mg; 80 mg		ISHSP	A10BB09
glimepirid	Tableta: 2 mg, 3 mg		ISHSP	A10BB12
repaglinid	Tableta: 1 mg, 2 mg		ISHSP	A10BX02

empagliflozin	Format e forta orale: 10 mg, 25 mg Indikacioni: pacientët e hospitalizuar me DM tip 2 me nefropati diabetike, pacientët me DM tip 2 me pamjaftueshmëri të zemrës me FE të ulur, pacientët e hospitalizuar me pamjaftueshmëri të zemrës me FE të ulur		H(T)	A10BK03
glucagon	Pluhur dhe tretësirë për tretësirë për injeksion në shiringë të pamambushur: 1 mg		ISHSP	H04AA01
insulina analoge me veprim të shpejtë	Aspart Insuline Pen/Shiringë e mbushur/Sol. për injektim 100UI/mL;3mL,SC		H(S/T), PP	A10AB05
	Lispro Insuline		H(S/T), PP	A10AB04
	Glulisine Insuline		H(S/T), PP	A10AB06
insulina analoge me veprim të zgjatur	Detemir Insuline Pen/Shiringë e mbushur/Sol. për injektim 100UI/mL;3mL,SC		H(S/T), PP	A10AE05
	Glargine Insuline Pen/Shiringë e mbushur/Sol. për injektim 100 IU/mL (3 mL), 300 IU/mL (1.5 mL		H(S/T), PP	A10AE04
	Insulin Degludec Pen/Shiringë e mbushur/Sol. për injektim 100 UI/mL;SC, 200UI/mL;SC		H(S/T), PP	A10AE06
insulina analoge bifazike (premix) me veprim të shpejtë dhe të mesëm	Insulin aspart Pen/Shiringë e mbushur/Sol. për injektim 100UI/mL;3mL,SC		H(S/T), PP	A10AD05
	Aspart Protamine Insuline (30/70; 25/75; 50/50; 70/30)		H(S/T), PP	
insulinat humane me veprim të shpejtë	Regular Insulin Pen/Shiringë e mbushur/Sol. për injektim 100UI/mL;3mL,SC		H(S/T), PP	A10AB01
insulinat humane me veprim të mesëm	NPH Insulin Pen/Shiringë e mbushur/Sol. për injektim 100UI/mL;3mL,SC		H(S/T), PP	A10AC01
insulinat humane bifazike (premix) me veprim të shpejtë dhe të mesëm	Regular Insulin/NPH Insulin Pen/Shiringë e mbushur/Sol. për injektim 100UI/mL;3mL,SC (25/75; 15/85; 30/70; 50/50)		H(S/T), PP	A10AD01
metformin	Tableta: 500 mg , 850 mg, 1g		ISHSP	A10BA02
octreotide	Injeksion: 10 mg, 20 mg		H(T)	H01CB02
	Injeksion: 50 - 100 mcg			
17.6 Progestogjenet				
medroxyprogesterone acetate	Tableta: 5 mg		H(S/T)	G03AC06
17.7 Hormonet e tiroides dhe barnat antitiroide				
levothyroxine	Tableta: 25 mcg, 50 mcg, 100 mcg (natrium salt)		H(S/T), PP	H03AA01
	Injeksion: 100 mcg		H(S/T)	
potassium iodide	Tableta: 60 mg		H(S/T)	V03AB21
propylthiouracil	Tableta: 50 mg		H(S/T), PP	H03BA02
etelcalcetide	Tretësirë për injeksion: 5 mg/ mL Indikacioni: parandalimi dhe trajtimi i hiperparatiroidizmit sekondar te pacientët në hemodializë dhe dializë peritoneale		H(S/T)	H05BX04
lugol's solution	Tretësirë orale: about 130 mg total iodine/mL		H(S/T)	H03CA
thiamazole	Tableta: 20 mg		H(S/T), PP	H03BB02
	Injeksion: 40 mg/mL		H(T)	
17.8 Barnat të cilat përdoren për trajtimin e hiperprolaktinemisë				

cabergoline	Tableta: 0.5 mg		H(S/T)	N04BC06
17.9 Barnat të cilat përdoren për trajtimin e feokromocitomës				
phenoxybenzamine	Format e forta orale: 10 mg Indikacioni: trajtimi preoperator i feokromocitomës		H(T)	C04AX02
18. IMUNOLOGJIKËT				
18.1 Agjentet diagnostik				
Të gjitha tuberkulinat duhet të jenë në harmoni me kërkesa të OBSH për tuberkulina				
tuberculin, purified protein derivative (PPD)	Injeksion		ISHSP	V04CF01
18.2 Sera dhe imunoglobulinat				
Të gjitha fraksionet e plazmës duhet të përputhen me kërkesat e OBSH				
diphtheria antitoxin	Injeksion: 10 000 IU; 20 000 IU në flakon		ISHSP	J06AA01
18.3 Vaksinat dhe imunoglobulinat				
vaksina kundër tuberkulozit, bacillus calmette-guerin (BCG)	ampullë me tretës - vaksinë e gjallë, 0.05 mL ID		ISHSP	J07AN01
vaksina kundër Hepatit B - pediatrik	flakon me suspension - ADN rekombinante ose e derivuar nga plazma, 0.5 mL IM		ISHSP	J07BC01
vaksinë kundër difterisë, tetanozit, pertusisit (acelular) -DTaP, poliomielitit-IPV (i inaktivizuar), i adsorbuar dhe Haemophilus influenzae tipi b (i konjuguar)	flakon, pluhur dhe suspension per suspension për injeksion - vaksinë bakteriale dhe virale e kombinuar, 0.5 mL IM		ISHSP	J07CA06
vaksinë kundër pneumokokut (1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F dhe 33F)	suspension për injeksion - konjugat polisakaridi pneumokokal i lidhur me një proteinë mbartëse, 0.5 mL IM		ISHSP	J07AL02
vaksina kundër rotavirusit	suspension oral - virale, e gjallë e dobësuar, 1 mL PO		ISHSP	J07BH01
vaksina kundër morbillit, parotitit, rubelles (MMR)	flakon me tretës - virale, e gjallë e dobësuar, 0.5 mL SC		ISHSP	J07BD52
vaksina kundër difterisë, tetanusit, pertusisit (DTP)	flakon, suspension i gatshëm për përdorim - bakteriale e kombinuar, 0.5 mL IM		ISHSP	J07AJ52
vaksina kundër difterisë, tetanusit (TD)	flakon, suspension i gatshëm për përdorim - toksoide të kombinuara, 0.5 mL IM		ISHSP	J07AM51
vaksina difteri, tetanus (Td) - prodhues	flakon. Suspension i gatshëm për përdorim - toksoide të kombinuara, 0.5 mL IM		ISHSP	J07AM51
vaksina kundër poliomielitit (bOPV) Tipet 1 dhe 3	suspension oral - virale, e gjallë e dobësuar, 0.1 mL PO		ISHSP	J07BF04
vaksina kundër poliomielitit (IPV)	flakon, suspension për injeksion - virale, e vdekur, 0.5 mL IM		ISHSP	J07BF03

vaksina kundër rabiesit	flakon me tretës - vakcina e liofilizuar, 1 mL IM		ISHSP	J07BG01
vaksina kundër hemophilus influenza tip B	flakon me tretës, - konjugat polisakaridi pneumokokal i lidhur me një proteinë mbartëse, 0.5 mL IM		ISHSP	J07AG51
vaksina kundër hepatitit B-adult	flakon, tretësire e gatshme për përdorim - ADN rekombinante ose e derivuar nga		ISHSP	J07BC01
vaksina kundër pneumokokut 23v	tretësirë për injeksion, gatshme per perdorim - konjugat polisakaridi pneumokokal i lidhur me një proteinë mbartëse, 0.5 mL IM		ISHSP	J07AL01
vaksina kundër meningjitit monokoksik (A, C, W-135, Y)	pluhur dhe tretës për tretësirë për injeksion - vaksinë e konjuguar, 0.5 mL IM		ISHSP	J07AH08
vaksina kundër hepatitit A	suspension për injeksion - virale, e çaktivizuar, 0.5 mL IM		ISHSP	J07BC08
vaksina kundër varicellës	flakon, pluhur dhe tretes për suspension për injeksion - virale, e gjallë e dobësuar, 0.5		ISHSP	J07BK
vaksina kundër gripit sezonal	flakon, tretësirë e gatshme për përdorim, 0.5 mL IM		ISHSP	J07BB02
vaksina kundër gripit sezonal pediatrik	flakon, tretësirë e gatshme për përdorim, 0.25 mL IM		ISHSP	J07BB02
vaksina kunder etheve tifoide	flakon e gatshme për përdorim, 0.5 mL IM		ISHSP	J07AP03
vaksina kundër papillomavirusit njerëzor	suspension për injeksion e gatshme për përdorim, 0.5 mL IM		ISHSP	J07BM01
serumi kunder kafshimit te gjarprit (vipera ammodytes dhe vipera berus)	ampullë, tretësirë për injeksion - serum, me origjine jo humane (kali), 100 AU; SC, IM		ISHSP	J06AA03
antitrupat human monoklonal kundër rabiesit (Rdna)	flakon, e gatshme për përdorim, 100 IU/2.5 mL ID		ISHSP	J06BB05
imunoglobulina kunder hepatitit B	tretësirë për injeksion, 180 IU/mL IM		ISHSP	J06BB04
imunoglobulina kundër tetanusit	tretësirë për injeksion, 250 IU; IM		ISHSP	J06BB02
vaksina kunër etheve te verdha	pluhur dhe tretës për suspension për injeksion - virale, e gjalle e dobësuar, 0.5 mL SC		H(S/T)	J07BL01
19. Relaksuesit muskular (me veprim periferik) dhe frenuesit e kolinesterazës				
atracurium	Injeksion: 10 mg/ mL (besilat)		H(S/T)	M03AC04
neostigmine	Injeksion: 500 mcg në ampullë 1 mL, 2.5 mg (metilsulfat) në ampullë 1 mL		H(S/T)	N07AA01
suxamethonium	Injeksion: 100 mg në 2 ose 5 mL		H(S/T)	M03AB01
vecuronium	Pluhur për injeksion: 10 mg (bromur) në flakon		H(S/T)	M03AC03
pancuronium	Injeksion: 2 mg/mL, 2 mL IV		H(S/T)	M03AC01
rocuronium	Injeksion: 10 mg/mL, 5 mL IV		H(S/T)	M03AC09
dantrolene*	Pluhur për tretësirë: 20 mg/mL		H(S/T)	M03CA01
	*Në çdo spital te paktën sasi për një pacient			
20. PREPARATET OFTALMOLOGJIKE				

faricimab	Injeksion intravitreal: 120 mg Indikacionet: degjenerimi makular i lidhur me moshën (forma e lagësht), edema makulare diabetike *Ky bari ipet pas aprovimit të dhënë nga konziliumi i përbërë nga tre specialistë të fushës të oftalmologjisë.		H(T)	S01LA09
brolucizumab	Injeksion intravitreal: 120 mg Indikacionet: degjenerimi makular i lidhur me moshën (forma e lagësht), edema makulare diabetike *Ky bari ipet pas aprovimit të dhënë nga konziliumi i përbërë nga tre specialistë të fushës të oftalmologjisë.		H(T)	S01LA06
20.1 Barnat anti-infektive				
ofloxacin	Tretësirë (pika për sy): 0.3%		ISHSP	S01AE01
tetracycline	Pomadë për sy: 1% (hidroklorur)		ISHSP	S01AA09
chloramphenicol	Pomadë: 1%, për sy		ISHSP	S01AA01
tobramycin	Tretësirë (pika për sy): 3 mg/mL (0.3%)		ISHSP	S01AA12
tobramycin, dexamethasone	Tretësirë (pika për sy): 3 mg+1 mg/mL		ISHSP	S01CA01
dexamethasone, neomycin sulphate, polymyxin B sulphate	Pomadë: 1.0 mg+3500 IU/g+6000 IU/g		ISHSP	S01CA01
20.2 Agjentet anti-inflamatore				
prednisolone	Tretësirë (pika për sy): 0.5% (natrium fosfat)		ISHSP	S01BA04
dexamethasone	Tretësirë (pika për sy): 1 mg/mL		ISHSP	S01BA01
20.3 Anestezikët lokal				
tetracaine a	Tretësirë (pika për sy): 0.5% (hidroklorur)		H(S/T)	S01HA03
	a - jo për përdorim te neonatet e parakohshëm			
20.4 Miotikët dhe barnat antiglaukomë				
timolol	Tretësirë (pika për sy): 0.25%, 0.5% (si maleat hidrogjeni)		H(S/T)	S01ED01
diclofenac natrium	Tretësirë (pika për sy): 0.1%, 5 mL		H(S/T)	S01BC03
20.5 Midriatikët				
atropine a	Tretësirë (pika për sy): 0.1%; 0.5%; 1% (sulfat)		H(S/T)	S01FA01
	a >3 muajsh			
tropicamid	Tretësirë (pika për sy): 0.5%		H(S/T)	S01FA06
21. Uterotonikët dhe tokolitikët				
21.1 Uterotonikët				
ergometrine	Injeksion: 200 mcg (hydrogen maleate) në ampullë 1 mL		H(S/T), PP	G02AB03
misoprostol	Tableta: 200 mcg		H(S/T)	G02AD06

oxytocin	Koncentrat për tretësirë për infuzion: 10 IU në 1 mL Koncentrat për tretësirë për infuzion:: 5 IU në 1 mL		H(S/T)	H01BB02
22. Tretësirat për dializë peritoneale				
23. BARNAT PER ÇRREGULLIMET MENDORE DHE TË SJELLJES				
23.1 Barnat të cilat përdoren te çrregullimet psikotike				
cariprazine	Kapsula: 1.5 mg, 3 mg Indikacionet: shizofrenia, çrregullimi bipolar		H(S/T)	N05AX15
fluphenazine	Injeksion: 25 mg (dekanoat ose enantat) në ampullë 1 mL		H(S/T)	N05AB02
olanzapine	Tableta: 10 mg Oribleta: 10 mg		H(S/T)	N05AH03
risperidone	Format e forta orale: 1 mg, 2 mg, 3 mg Depo - inj.: 25 mg, 37.5 mg		H(S/T) H(S/T)	N05AX08
aripiprazol	Tableta: 10 mg, 15 mg		H(S/T)	N05AX12
clozapine	Format e forta orale: 25 mg, 100 mg		H(S/T)	N05AH02
quetiapine	Tableta: 25 mg, 200 mg		H(S/T)	N05AH04
haloperidol	Injeksion: 5 mg/1 mL, IM		H(S/T)	N05AD01
	Injeksion, depo: 50 mg/mL 1 mL		H(S/T), PP	
	Tretësirë orale/pika: 2 mg/mL		H(S/T)	
	Format e forta orale: 2 mg, 10 mg		H(S/T)	
23.2 Barnat të cilat përdoren te çrregullimet e disponimit				
23.2.1 Barnat të cilat perdoren në gjendjet depresive				
duloxetine	Kapsula: 30 mg, 60 mg Indikacionet: epizodat e rënda depresive, çrregullimet rekurente depresive, dhimbja neuropatike		H(S/T)	N06AX21
amitriptyline	Tableta: 25 mg (hidroklorur)		H(S/T)	N06AA09
fluoxetine	Format e forta orale: 20 mg (as hidroklorur)		H(S/T)	N06AB03
escitalopram	Format e forta orale: 10 mg, 20 mg		H(S/T)	N06AB10
mirtazapine	Format e forta orale: 30 mg		H(S/T)	N06AX11
23.2.2 barnat të cilat përdoren te çrregullimet bipolare				
lithium carbonate	Format e forta orale: 300 mg		H(S/T)	N05AN01
23.3 Barnat të cilat perdoren te çrregullimet e ankthit				
alprazolam	Tableta: 0.5 mg		H(S/T), PP	N05BA12
24. BARNAT TË CILAT PËRDOREN TE TRAKTI RESPIRATOR				
24.1 ANTIASMTATIKËT DHE BARNAT TJERA PËR SËMUNDJEN OBSTRUKTIVE KRONIKE TË MUSHKËRIVE				
budesonide	Suspension për inhalim: 0.25 mg/mL, 2 mL		ISHSP	R01AD05
	Kapsulë inhaluese: 200 mcg dhe 400 mcg		ISHSP	
formoterol	Kapsulë inhaluese: 12 mcg		ISHSP	R03AC13
ipratropium bromide+salbutamol	Tretësirë për inhalim: 2.5 mg + 0.5 mg/metered dozë		ISHSP	R01AX03
salbutamol	Inhalim (aerosol): 100 mcg (si sulfat) për dozë		ISHSP	R03AC02

	Tretësirë per përdorim me inhalator: 5 mg (si sulfat)/mL		ISHSP	
glycopyrronium bromide	Injeksion: 0.2 mg/mL Kapsulë për inhalim: 50 mcg Indikacionet: parandalimi i bradikardisë perioperative; forma e moderuar, e rëndë, shumë e rëndë e sëmundjes kronike obstruktive të mushkërive (stadi II- IV)		H(S/T) PËR INJEKSIONET H(T) PËR KAPSULAT	A03AB02
aminophylline	Injeksion: 25 mg/mL, 10 mL		ISHSP	R03DA05
indacaterol	Kapsula për inhalim: 150 mcg dhe 300 mcg		ISHSP	R03AC18
monteleukast	Formë e fortë orale: 10 mg		ISHSP	R03DC03
24.2 BARNAT TË CILAT PËRDOREN TE SËMUNDJET FIBROTIKE TË MUSHKËRIVE				
nintedanib	Kapsulë: 150 mg Indikacioni: Fibroza pulmonare idiopatike familjare		H(T)	L01EX09
25. TRETËSIRAT QË KORREKTOJNË UJIN, ELEKTROLITET DHE BALANSIN ACIDO-BAZIK				
25.1 Orale				
enteral solution	Tretësirë: 200-500 mL		H(S/T)	V06
25.2 Parenterale				
glucose	Tretësirë injektuese: 5% (izotonike) 100 mL, 500 mL; 10% (hipertonike) 500 mL; 20% 500 mL; 50% (hipertonike) 20 mL		ISHSP	B05BA03
glucose with sodium chloride	Tretësirë injektuese: 4% glucose, 0.18% klorur natriumi (ekuivalent me Na+ 30 mmol/L, Cl- 30 mmol/L)		ISHSP	B05XA30
	Tretësirë injektuese: 5% glucose, 0.9% sodium chloride (ekuivalent to Na+ 150 mmol/L and Cl- 150 mmol/L), 5% glucose, 0.45% sodium chloride (ekuivalent to Na+ 75 mmol/L and Cl- 75 mmol/L)		ISHSP	
potassium chloride	Tretësirë: 11.2% në ampullë 20- mL (ekuivalent me K+ 1.5 mmol/mL, Cl- 1.5 mmol/mL)		H(S/T)	B05XA01
	Tretësirë: 7.45%-7.5% (ekuivalent me K+ 1 mmol/mL dhe Cl- 1 mmol/mL)/20 mL [c]; 15% (ekuivalent me K+ 2 mmol/mL dhe Cl- 2 mmol/mL)		H(S/T)	
sodium chloride	Tretësirë injektuese: 0.45% 500 mL; 0.9% 100 mL, 500 mL izotonik (ekuivalent me Na+ 154 mmol/L, Cl- 154 mmol/L), 3% 500 mL, 6% te rastet me fibrozë cistike		ISHSP - PËR TRETËSIRËN IZOTONIKE H(S/T) - PËR TRETËSIRAT HIPOTONIKE DHE HIPERTONIKE	B05XA03

sodium hydrogen carbonate	Tretësirë: 8.4% në ampullë 10- mL ose 20 mL (ekuivalent to Na ⁺ 1000 mmol/L, HCO ₃ -1000 mmol/L)		H(S/T)	B05XA02
sodium lactate, compound	Tretësirë injektuese: 500 mL		H(S/T)	B05XA
albumins	Tretësirë për infuzion: 20%, 50 mL		H(S/T)	B05AA01
fat emulsion	Tretësirë për infuzion: 20%, 500 mL		H(S/T)	B05BA02
aminoacids	Tretësirë për infuzion: 500 mL		H(S/T)	B05BA01
aminoacids for neonates 0-1y	Tretësirë për infuzion: 10%, 250 mL		H(S/T)	B05BA01
polygeline	Tretësirë për infuzion: 3.5% - 500 mL		H(S/T)	B05AA06
parenteral nutrition	Tretësirë për infuzion: 1000 - 2500 mL		H(S/T)	B05BA10
aminoacids (renal failure)	Tretësirë për infuzion: 8%, 500 mL		H(S/T)	B05BA01
aminoacids (alpha ketoanalog)	Tableta: 600 mg Indikacioni: pamjaftueshmëria e veshkave e shkallës II-IV		H(S/T)	B05BA
polystyrene calcium sulfonate	Pluhur për tretësirë orale: 450 g Indikacioni: hiperkalemia me anuri ose oliguri, hiperkalemia akute dhe kronike të sëmundjet e veshkave		H(S/T)	V03AE01
potassium citrate*	Granula: 20 mmol Indikacioni: acidoza tubulare renale *Ky bari është në konceptdokumentin për sëmundje të rralla		H(T), H(amb)	A12BA02
25.3 Tjera				
water for injection	5- mL; 10- mL (ampullë)		ISHSP	V07AB
26. VITAMINS AND MINERALS				
ascorbic acid	Tableta: 50 mg, 100 mg, 500 mg Injeksion: 500 mg/5 mL, 1 g/5 mL		ISHSP	A11GA01
thiamine	Tretësirë për injeksion: 5%		ISHSP	
pyridoxine	Tretësirë për injeksion: 5%		H(S/T)	A11DA01
vitamin B complex	Tretësirë për injeksion: 2 mL		H(S/T)	A11HA02
calcium gluconate	Injeksion: 100 mg/ mL në ampulla 10- mL		ISHSP	A11AE
vitamin ADEK	Tretësirë Indikacioni: Fibroza Cistike		ISHSP	A11
	Tabletë Indikacioni: Fibroza Cistike			
vitamin D	Ampullë për përdorim oral dhe IM: 300 000 IU		ISHSP	A12AA03
27. BARNAT QË PËRDOREN NË OTORINOLARINGOLOGJI				
budesonide	Sprej nazal: 100 mcg për dozë		ISHSP	R01AD05
ciprofloxacin	Topikal: 0.3% drops (si hidroklorur)		ISHSP	S02AA15
28. BARNAT SPECIFIKE PËR KUJDES NEONATAL				
28.1 Barnat që përdoren te neonatët				
caffeine citrate	Injeksion: 20 mg/mL (ekuivalent me 10 mg caffeine base/mL)		H(S/T)	N06BC01
	Tretësirë orale: 20 mg/mL (ekuivalent me 10 mg caffeine base/mL)		H(S/T)	

chlorhexidine	Tretësirë ose gel: 7.1% (digluconate) 4% chlorhexidine (për kërthizën)	kujdes për	H(S/T)	A01AB03
ibuprofen	Tretësirë for injeksion: 5 mg/mL		H(S/T)	R02AX02
prostaglandin E	Prostaglandin E1 (alprostadil), tretësirë për injeksion: 0.5 mg/mL		H(S/T)	C01EA01
	Prostaglandin E2 (dinoprostone), tretësirë për injeksion: 1 mg/mL		H(S/T)	G02AD02
surfactant	Suspension për instilim intratekal: 25 mg/mL ose 80 mg/mL		H(S/T)	R07AA
29. BARNAT PËR SEMUNDJET E NYJEVE				
29.1 Barnat të cilat përdoren për trajtimin e çrregullimeve të acidit urik				
allopurinol	Tableta: 100 mg		H(S/T), PP	M04AA01
rasburicase	Pluhur dhe tretës për tretësirë për infuzion: 1.5 mg/mL Indikacioni: sindroma tumor lysis		H(T)	V03AF07
29.2 Agjentët-modifikues të cilët përdoren të çrregullimet autoimune				
febuxostate	Tableta: 80 mg Indikacionet: hyperurikemia, artriti urik		H(S/T), PP	M04AA03
hydroxychloroquine	Tableta: 200 mg Indikacionet: artriti reumatoid, lupus eritematosus, sindroma sjogren		H(S/T), PP	P01BA02
paricalcitol	Injeksion: 5 mcg/mL		H(S/T)	H05BX02
sevelamer	Tableta: 800 mg		H(S/T), PP	V03AE02
interferon alfa 2a	Tretësirë/shiringa: 3 miu/0.5 mL		H(T)	L03AB04
interferon beta -1 b	Tretësirë/shiringa: 250 mcg/mL		H(T), H(amb)	L03AB08
fingolimod	Tableta: 0.5 mg		H(T), H(amb)	L04AA27
ocrelizumab	Koncentrat për infuzion: 300 mg/10 mL		H(T), H(amb)	L04AA36
interferon beta 1a	Tretësirë/shiringa: 2 mcg SC, 44 mcg SC		H(T), H(amb)	L03AB07
terapia zëvendësuese e enzimave	terapia tjetër enzimatike (morbus gaucher)		H(T), H(amb)	A16AB
nitisinone	Format e forta orale: 5 mg		H(T), H(amb)	A16AX04
30. BARNAT TJERË				
dimethyl fumarate	Kapsula: 240 mg Indikacioni: forma relaps/remitente e sklerozës multiple		H(T), H(amb)	L04AX07
C1 esterase inhibitor*	Pluhur dhe tretës për tretësirë për injeksion: 2100 IU Indikacioni: angioedema hereditare *Ky bari është në konceptdokumentin për sëmundje të rralla		H(T)	B06AC01
deflazacort*	Suspension oral: 22.75 mg/mL Tableta: 30 mg Indikacioni: distrofia muskulare e Duchenne *Ky bari është në konceptdokumentin për sëmundje të rralla		H(T)	H02AB13

apremilast*	Tableta: 30 mg Indikacioni: sindroma Behçet *Ky bari është në konceptdokumentin për sëmundje të rralla		H(T)	L04AA32
everolimus*	Tableta: 10 mg Indikacioni: sclerosis tuberosa complexa *Ky bari është në konceptdokumentin për sëmundje të rralla		H(T)	L01EG02
alpha-glucosidase*(!)	Pluhur për tretësirë për injeksion: 50 mg Indikacioni: sëmundja e Pompeut *Ky bari është në konceptdokumentin për sëmundje të rralla		H(T)	A16AB07
dinutuximab beta*(!)	Koncentrat për tretësirë për infuzion: 20 mg/4.5 mL Indikacioni: neuroblastoma refraktare dhe ato të rrezikut të lartë *Ky bari është në konceptdokumentin për sëmundje të rralla		H(T)	L01FX06
ofatumumab	Tretësirë për injeksion në shiringë të parambushur: 20 mg/0.4 mL Indikacioni: forma relaps/remitente shumë aktive e sklerozës multiple		H(T), H(amb)	L04AA52
cladribine	Tableta: 10 mg Indikacioni: forma relaps/remitente shumë aktive e sklerozës multiple		H(T), H(amb)	L04AA40
risdiplam	Pluhur për tretësirë orale: 0.75 mg/mL Indikacioni: SMA		H(T), H(amb)	M09AX10
dornase alfa	Tretësirë për inhalim: 2.5 mg/ 2.5 mL (2500 IU/ 2.5 mL) Indikacioni: fibroza cistike		H(T)	R05CB13
pyrimethamine	Tabletë: 25 mg Indikacioni: toksoplazmoza		H(T), H(amb)	P01BD01
omalizumab	Tretësirë për injeksion në shiringë të parambushur: 150 mg/mL Indikacioni: urtikaria spontane idiopatike kronike (atëherë kur ka dështuar trajtimi me regjimin me antihistaminikë)		H(T)	R03DX05
Dermatologjia (përveç preparateve tjerave të cilat janë në listën bazike)				
erythromycin	Tretësirë (Lotion): 4%		ISHSP	D10AF02
erythromycin	Gel: 2%		ISHSP	
clindamycin	Tretësirë 1%		ISHSP	D10AF01
gentamicine	Kremë (ointment): 0.1 %		ISHSP	D06AX07
fucidic acid	Gazë: 2%		ISHSP	D06AX01
fucidic acid	Kremë: 2%		ISHSP	
oxytetracycline + hydrocortisone	Pomadë: 1 %		ISHSP	D06AA03
chloramphenicol	Pomadë: 5%		ISHSP	D06AX02

cyclopyroxolamine	Pluhur: 1%,		ISHSP	D01AE14
cyclopyroxolamine	Tretësirë: 8%		ISHSP	
terbinafine	Tableta: 250 mg		ISHSP	D01BA02
nystatine	Pomadë: 100 000 IU/g		ISHSP	D01AA01
clotrimazol	Tretësirë: 1 %		ISHSP	D01AC01
clotrimazol	Kremë		ISHSP	
isokonazolnitrat + difluortolon	Kremë		ISHSP	D01AC20
miconazol	Gel		ISHSP	D01AC02
ketokonazol	Kremë		ISHSP	D01AC08
ketokonazol	Tretësirë: 2 %		ISHSP	
oxyconazol	Sprej		ISHSP	D01AC11
oxyconazol	Kremë: 1 %		ISHSP	
clocortolon	Kremë: 0.1 %		ISHSP	D07AB21
betamethasone + salicylic acid	Pomadë: 0.05% Ac.salyc. 3%		ISHSP	D07X
betamethasone + salicylic acid	Kremë: 0.05% Ac.salyc. 3%		ISHSP	
betamethasone + salicylic acid	Tretësirë: 0.05% Ac.salyc. 3%		ISHSP	
betamethasone + gentamycine	Kremë ose yndyrë: 0.05% Gentamycin 1%		ISHSP	D07CC01
fluocinolone	Kremë ose yndyrë: 0.25 mg/g		ISHSP	D07AC04
mometasone	Losion: 0.1%		ISHSP	D07AC13
mometasone	Pomadë: 0.1%		ISHSP	
mometasone	Kremë: 0.1%		ISHSP	
triamcinolone	Injeksion: 40 mg/mL		H(S/T)	H02AB08
prednisone	Tableta: 5 mg		ISHSP	H02AB07
prednisone	Tableta: 20 mg		ISHSP	
dexamethasone	Tretësirë: 0.2%		ISHSP	D07AB19
methylprednisolone	Kremë: 0.1 %		ISHSP	D07AA01
urea	Kremë: 40%		ISHSP	D02AE01
quiphenadine	Tableta: 10 mg		ISHSP	R06AX31
quiphenadine	Tableta: 25 mg		ISHSP	
desloratadine	Tretësirë orale: 2.5 mg/5 mL		ISHSP	R06AX27
sulfur pp	Unguentum: 10%, 15%		ISHSP	D10AB02
pimecrolimus	Kremë: 0.1 %		ISHSP	D11AH02
tacrolimus	Pomadë: 0.1%		ISHSP	D11AH01
fluoro –uracil-ac.salyc-dimetil sul.	Tretësirë: fluoro –uracil 0.5%, ac.salyc. 10.0% , dimetil sul. 8.0 %		H(S/T)	L01BC52
tretinoin (VITAMIN A – ACID)	Kremë: 0.05 %		ISHSP	D10AD01
tretinoin (VITAMIN A – ACID)	Kapsula: 20 mg		ISHSP	
dexpantenol	Pomadë: 5 %		ISHSP	D03AX03
calcipotriol	Pomadë: 50 mcg/g		ISHSP	D05AX02
calcipotriol	Kremë: 0.005%		ISHSP	
boric acid	Pulvis		ISHSP	S02AA03
gentiana violet	Tretësirë: 0.1%		ISHSP	D01AE02
	Tretësirë: 1%		ISHSP	
etacridine lactate	Tretësirë: 1%		ISHSP	D08AA01

eta, ure + acid salicilik + acid laktik + baze emoliente	Tretësirë: ETA, ure 10%, acid salicilik 1,5%, acid laktik 1% baze emoliente	H(S/T)	D02A
hyaluronic acid + sulfadiazine	Kremë: 2%	ISHSP	D06BA51
hyaluronic acid + sulfadiazine	Gazë	ISHSP	
hyaluronic acid + sulfadiazine	Sprej	ISHSP	
oleum jecoris	Pomadë	ISHSP	D11AX
solcoseryl (protein free haemodialysate of calvis)	Pomadë: ekstrakt te gjakut te vicit 125 gr	ISHSP	D03AX
lekobaze	Kremë, kg	ISHSP	
lanolin	Pomadë, kg	ISHSP	
vaseline	Pomadë, kg	ISHSP	
liquid powder	100 mL	ISHSP	
diclofenac	Gel: 3 %	ISHSP	D11AX18
(!)Preparatet me këtë shenjë dalluese duke përfshirë edhe produktet për leishmania dhe malaria sigurohen përmes furnizimit në rast të paraqitjes të ndonjë rasti.			
Preparatet biosimilare porositen vetëm nëse janë në listën e aprovuar nga EMA			
Përdorimi i antibiotikëve bëhet sipas udhëzuesit për përdorimin e antibiotikëve në KPSH (MSH, 2023)			